

メタアルデヒド粒剤 ナメクリン3	取扱メーカー： サンケイ 原体メーカー： ロンザ
成分： メタアルデヒド……………3.0%	性状： 暗青色粒状 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- メタアルデヒドはナメクジ、カタツムリを誘引する作用があり、毒作用も示す。
- 摂取すると、麻痺したような症状を示し、やがて死亡する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 常発地帯では、は種又は移植前に処理して作物の発芽前に誘殺すると効果的である。
- ナメクジ、カタツムリは夜間、特に湿度の高い日によく加害するので晴天乾燥の時よりも湿潤な日の夕方に処理すると良い。
- 温室では2～3日間灌水がかからないようにする。

- 強い雨にあうと流失して効果がなくなるので天候を見定めてから処理する。
- 作物体にかからないように株元に散布する。

【安全対策上の注意】……………

- 犬、猫などのペット類や家畜・家きん等が多量に食べると死亡するおそれがあるので、食べる可能性のある場所での保管及び使用はしない。
- 共通注意事項6、街路・公園・堤とう等で使用する場合は注意事項を参照。

【適用と使用法】……………

作物名	適用病害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	メタアルデヒドを含む 農薬の総使用回数
かんきつ	ナメクジ類 カタツムリ類	1～3kg	30日前まで	3回以内	株元散布	6回以内 (散布及び株元散布 は合計3回以内)
キャベツ レタス			14日前まで	2回以内		6回以内 (散布及び株元散布 は合計3回以内 (但し、株元散布は 2回以内))
はくさい		3kg	3日前まで			6回以内 (株元散布は2回以内)
いちご	ナメクジ類		前日まで			
花き類・ 観葉植物	ナメクジ類 カタツムリ類	1～3kg	—	6回以内		