

<b>ポリオキシシン乳剤</b> <b>ポリオキシシン AL 乳剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> クミカ，日農，一農，琉産  <b>原体メーカー：</b> 科研製薬
<b>成分：</b> ポリオキシシン複合体〔抗生物質〕……………10.0% （ポリオキシシンBとして100,000AmBu／g） <b>その他 PRTR 該当成分：</b> ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル(PRTR・1種)…0～2%	<b>性状：</b> 淡黄色透明液体 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

- うどんこ病，葉かび病などに高い防除効果を持つ。
- ポリオキシシンAL水和剤の項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- ボルドー液等強アルカリ性薬剤との混用はさける。
- 適用作物（トマト，きゅうり，いちご，ピーマン，なす）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 耐性菌出現を防止するため過度の連用はさけ，他剤との輪番で使用する。

### 【適用と使用法】……………

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	ポリオキシシンを含む 農薬の総使用回数
ト マ ト	うどんこ病	1000 倍	前日まで	3 回以内	散布	3 回以内
き ゅ う り				2 回以内		2 回以内
い ち ご			収穫開始 14 日前まで	3 回以内		3 回以内
な す			前日まで			
ピ ー マ ン		500 ～ 1000 倍	収穫開始 14 日前まで	5 回以内		5 回以内
ば ら ぎ			——	——		——
カーネーション	斑点病					