

ダイムロン・プレチラクロール粒剤 パデホープ1キロ粒剤	取扱メーカー： クミカ 原体メーカー： エス・ディー・エス、シンジェンタ
成分： ダイムロン〔尿素系〕……………15.0% プレチラクロール〔酸アミド系 PRTR・1種〕……………3.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】……………

- 一年生から多年生まで広範囲の雑草に優れた除草効果を発揮する水稲用初期除草剤である。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 共通注意事項の5、水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 雑草の発生前から発生始期に有効なので時期を失しないように散布する。
- 多年生雑草は生育段階により効果にフレが出るので、必ず適期に散布する。

雑草名	散布適期
ホタルイ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	発生前～発生始期まで

【薬効・薬害等の注意】……………

- 共通注意事項の5、水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- コナギ多発田では効果が劣ることがあるので、コナギに有効な剤との体系で使用する。
- 適用作物（水稲）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 魚類、藻類に影響を及ぼすので、使用时並びに使用後も注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。
- 無人航空機散布の際は、共通注意事項の2、空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。



【適用と使用法】……………

作物名	適用雑草名	適用土壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用 方法	適用地帯	本剤の 使用回数
移植水稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ヘラオモダカ (北海道, 東北, 北陸)	砂壤土～ 埴土	植代後～ 移植前7日 又は移植直後～ ノビエ1葉期 但し、移植後 30日まで	1 kg	湛水 散布	全域の普通期 及び早期栽培 地帯	1回 ※

※ダイムロンを含む農業の総使用回数：3回以内（育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内）

※プレチラクロールを含む農業の総使用回数：2回以内