

<b>シフルメトフェン水和剤</b> <b>ダニサラバフロアブル</b>	取扱メーカー： O A T, 協友アグリ  原体メーカー： O A T
成分：シフルメトフェン……………20.0%	性状：類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性：普通物 消防法：——

### 【品目特性】……………

- 新規骨格を有する殺ダニ剤である。
- 既存剤に対して感受性の低下したハダニ類にも有効である。
- テトラニカス、パノニカス両属に優れた効果を示す。
- 有用昆虫や天敵に対して実用濃度で影響が小さい。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 使用前に必ず容器をよく振る。
- 散布は年1回とし、作用性の異なる他の薬剤と輪番で使用する（抵抗性発達回避）。
- 植物体への浸透移行性が無いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布する。
- ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布ムラのないように丁寧に散布する。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- ボルドー液との混用はさける。また、ボルドー液との近接散布は14日以上の間隔をあける。
- ぶどうに使用する場合、無袋栽培においては果粉溶脱のおそれがあるため果実肥大期（だいず粒大）以降は散布はさける。

### 【安全対策上の注意】……………

- カブレやすい体質の人は取り扱いに十分注意する。



【適用と使用方法】 .....

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	シフルメトフェンを含 む農薬の総使用回数
かんきつ	ミカンハダニ	1000～ 2000倍	200～1000 ℓ	前日まで	2回以内	散布	2回以内
ぶ ど う	ハダニ類 ブドウヒメハダニ	1000倍	200～700 ℓ				
りんご びわ かき	ハダニ類						
なしも ネクタリン おうとう 小粒核果類 いちじく		1000～ 2000倍					
すいか メロン きゅうり いちご なす ピーマン やまのいも モロヘイヤ みつば みょうが (花穂)		1000倍	100～350 ℓ				
なんてん (葉)							
みょうが (茎葉)							
食用ぎく とうがん							
アスパラガス							
茶	カンザワハダニ	1000～ 2000倍	200～400 ℓ				
花き類・ 観葉植物	ハダニ類	1000倍	100～350 ℓ	発生初期			