

<b>シアントラニプロール粒剤</b> <b>プリロソソ粒剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> 日産、丸和 <b>原体メーカー：</b> FMC
<b>成分：</b> シアントラニプロール〔アントラニリックジアミド系〕…0.50%	<b>性状：</b> 類白色細粒 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】 .....

- チョウ目害虫に卓効を示し、コナジラミ類、アザミウマ類、アブラムシ等にも優れた効果を示す。
- 優れた吸収移行性と長い残効性を有する。
- だいこんではキスジノミハムシ、ハイマダラノメイガ、カブラハバチ等の同時防除が可能。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】 .....

- 散布ムラの無いように、丁寧に均一に散布する。

- セル苗処理，株元散布とともに適正な土壌水分があることが重要。粒剤散布後には十分に灌水する。
- 葉菜類のセルトレイ及び果菜類の育苗期後半に散布する場合，有効成分を作物に十分吸収させるために葉菜類の場合は定植5～7日前，果菜類の場合は定植7～10日前に散布するのがお薦め。

### 【薬効・薬害等の注意】 .....

- アルカリ性肥料との同時施用はさける。
- つまみ菜，間引き菜には使用しない。
- みずかけな（水掛菜）に使用する場合は，圃場内に水がない状態で使用する。使用後14日間は入水しない。

### 【適用と使用法】 .....

作物名	適障害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数
キャベツ	コナガ アオムシ アブラムシ類 アザミウマ類 ハイマダラノメイガ	セル成型育苗トレイ1箱又はペーパーポット1冊（約30×60cm，使用土壌 約1.5～4ℓ）当り 50g	育苗期後半～定植当日	1回	本剤の所定量をセル成型育苗トレイ又はペーパーポットの上から均一に散布する	4回以内（定植時までの処理は1回以内，定植後の散布は3回以内）
	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ	1g／株	育苗期後半～定植時		株元散布	
	アブラムシ類 アザミウマ類	2g／株				
はくさい	コナガ アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ	セル成型育苗トレイ1箱又はペーパーポット1冊（約30×60cm，使用土壌 約1.5～4ℓ）当り 50g	育苗期後半～定植当日	1回	本剤の所定量をセル成型育苗トレイ又はペーパーポットの上から均一に散布する	4回以内（定植時までの処理は1回以内，定植後の散布は3回以内）
	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ	1g／株	育苗期後半～定植時		株元散布	
	アブラムシ類	2g／株				

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数
ブロッコリー	コナガ アオムシ アブラムシ類 アザミウマ類	セル成型育苗トレイ 1 箱又はペーパーポット 1 冊 (約 30×60cm, 使用土壌 約 1.5 ～ 4 ℓ) 当り 50g	育苗期後半 ～定植当日	1 回	本剤の所定量をセル成型育苗トレイ又はペーパーポットの上から均一に散布する	4 回以内 (定植時までの処理は 1 回以内, 定植後の散布は 3 回以内)
	コナガ アオムシ	1g / 株	育苗期後半 ～定植時		株元散布	
	アブラムシ類 アザミウマ類	2g / 株				
レタス	オオタバコガ アブラムシ類 ハモグリバエ類	セル成型育苗トレイ 1 箱又はペーパーポット 1 冊 (約 30×60cm, 使用土壌 約 1.5 ～ 4 ℓ) 当り 50g	育苗期後半 ～定植当日	3 回以内	本剤の所定量をセル成型育苗トレイ又はペーパーポットの上から均一に散布する	4 回以内 (定植時までの処理は 1 回以内, 定植後の散布は 3 回以内)
	オオタバコガ ハモグリバエ類	1g / 株	育苗期後半 ～定植時			
	アブラムシ類	2g / 株				
ねぎ	アザミウマ類 ハモグリバエ類	6kg / 10a	収穫前日まで	3 回以内	株元散布	4 回以内 (定植時までの処理は 1 回以内, 定植後の処理は 3 回以内 (但し, 株元灌注は 1 回以内))
なばな類	アブラムシ類  アザミウマ類 コナジラミ類  コナジラミ類 ハモグリバエ類 アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	2g / 株	定植時	1 回	育苗培土混和	1 回
ピーマン			鉢上げ時		株元散布	4 回以内 (定植時までの処理は 1 回以内, 定植後の散布は 3 回以内)
			育苗期後半 ～定植時		育苗培土混和	1 回
トマト ミニトマト			鉢上げ時		株元散布	
			育苗期後半 ～定植時			
なす						
きゅうり	アブラムシ類	鉢上げ時	育苗培土混和	4 回以内 (定植時までの処理は 1 回以内, 定植後の散布は 3 回以内)		
	ハモグリバエ類 アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	育苗期後半 ～定植時	株元散布			
だいこん	コナガ アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ カブラハバチ キスジノミハムシ ネキリムシ類	6kg / 10a	は種時		播溝土壌混和	4 回以内 (は種時の土壌混和は 1 回以内, 散布は 3 回以内)
畑わさび	アザミウマ類 ワサビリイロサルゾウムシ		収穫21日前まで		全面土壌散布	1 回