

シラフルオフェン・バリダマイシン・フェリムゾン・フサライド粉剤 <b>ブラシンバリダジョーカー粉剤 DL</b>	取扱メーカー： 北興，住友化学 原体メーカー： バイエル，住友化学，住友化学， 住友化学
成分：シラフルオフェン……………0.50% バリダマイシン〔抗生物質〕……………0.30% フェリムゾン〔ピリミジン系 PRTR・1種〕……………2.0% フサライド〔有機塩素系 PRTR・1種〕……………1.5%	性状：類白色粉末45μm以下， 浮遊性指数20以下 毒性：普通物 消防法：——

### 【適用と使用方法】 .....

作物名	適用病害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	使用 方法	総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 穂枯れ（ごま葉枯病菌） ごま葉枯病 変色米（カーブラリア菌） 疑似紋枯症（赤色菌核病菌） 疑似紋枯症（褐色菌核病菌） 疑似紋枯症（褐色紋枯病菌） ウンカ類 カメムシ類 コブノメイガ ツマグロヨコバイ	3～4 kg	14 日前 まで	散布	本剤 2 回以内 シラフルオフェン 2 回以内 バリダマイシン 6 回以内 （育苗箱灌注は 1 回以内，本 田では 5 回以内） フェリムゾン 2 回以内 フサライド 3 回以内