

<b>カスガマイシン・TPN粉剤</b> <b>フタバロンA粉剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> 北興  <b>原体メーカー：</b> 北興、エス・ディー・エス
<b>成分：</b> カスガマイシンー塩酸塩〔抗生物質〕……………4.6% （カスガマイシンとして……………4.0%） TPN〔有機塩素系 PRTR・1種〕……………9.0%	<b>性状：</b> 類白色粉末45 $\mu$ m以下  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> —

### 【品目特性】……………

- 育苗培土に混和し、稲の育苗期に発生する細菌病などに効果を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 本剤を混和した土壌は、処理後数日以内に使用することが望ましい。

### 【安全対策上の注意】……………

- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- 魚類に影響を及ぼすので、使用时並びに使用後も注意。
- 桑葉にはかからないよう注意する（蚕毒）。



### 【適用と使用法】……………

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 (苗いもち) 苗立枯病 (リゾープス菌) もみ枯細菌病 苗立枯細菌病 褐条病	育苗箱 (30×60×3 cm, 覆土約 1 $\ell$ ) 覆土1 $\ell$ 当り 5 g	覆土前	1 回	覆土に 均一に 混和する。	4回以内 (種子浸漬は 1回以内, 育 苗箱への処理 は1回以内, 本田では2回 以内)	2回以内