

ダイムロン・ペノキスラム粒剤 フォローアップ1キロ粒剤	取扱メーカー： 三井アグロ 原体メーカー： エス・ディー・エス、ダウ
成分： ダイムロン〔尿素系〕……………10.0% ペノキスラム〔スルホンアミド系〕……………0.60%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 水稲用中・後期除草剤。初期剤、一発剤との体系で使用する。
- 薬剤を処理するに当って、田面水を落す必要がなく、湛水状態のままで散布できる。
- ペノキスラムの特性により、幅広い雑草に効果がある。
- ペノキスラムの特性により、ノビエ5葉期まで高い効果を示す。
- 直播水稲にも使用できる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意する。

〈移植水稲〉

雑草名	散布適期
ホタルイ ミズガヤツリ	5葉期まで
ウリカワ	6葉期まで
ヘラオモダカ	4葉期まで
クログワイ	草丈30cmまで
オモダカ	草丈30cm（発生盛期～矢じり葉抽出期）まで
コウキヤガラ	草丈15cmまで
ヒルムシロ セリ	生育期まで

〈直播水稲〉

雑草名	散布適期
ホタルイ	4葉期まで
ミズガヤツリ	3葉期まで
ウリカワ	3葉期まで
ヒルムシロ	発生期まで
セリ	再生前～再生始期まで

- クログワイ、オモダカ、コウキヤガラは有効な前処理剤と組み合わせて使用する。また、クログワイ、オモダカに有効な前処理剤と組み合わせて連年施用することにより、さらに効果が向上する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 前処理剤との体系で使用し、雑草の発生状況をよく確認し、時期を失ないように散布する。
- 適用作物（水稲）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（いぐさ、れんこん、せり、くわい）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 無人ヘリコプター散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

【適用と使用方法】

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ コウキヤガラ ヒルムシロ セリ シズイ	移植後15日～ノビエ 5葉期（稲4葉期以降） 但し、 収穫60日前まで	1 kg	湛水散布又は 無人ヘリコプ ターによる散 布	1回 ※
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲3葉期～ノビエ5葉期 但し、 収穫60日前まで			

※ダイムロンを含む農薬の総使用回数：移植水稻3回以内（育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内）
直播水稻2回以内

※ペノキスラムを含む農薬の総使用回数：2回以内