

イソプロチオラン乳剤 フジワン乳剤	取扱メーカー： 協友アグリ、日農、一農 原体メーカー： 日農
成分： イソプロチオラン〔ジチオラン系 PRTR・1種〕…40.0% その他 PRTR 該当成分： メチルナフタレン〔PRTR・1種〕……………21% (20～22%) ナフタレン〔PRTR・1種〕……………4.1% (最大4.1%)	性状： 淡褐色透明可乳化油状液体 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級Ⅲ

【品目特性】……………

- フジワン粒剤の項参照。
- 空中散布に適した薬剤で、液剤少量散布（LV）、液剤散布と共に可能、また、数多くの殺虫剤、殺菌剤と混用散布ができる。
- 大型高性能防除機散布にも適する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- いもち病に対して予防的に散布するのが効果的である。
- 本田の水稲に対して希釈倍数300倍で散布する場合は、少量散布に適したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用する。

〈穂いもち〉

- 発生が予想される場合、又は初発生を認めたら直ちに散布する。

〈穂いもち〉

- 原則として穂ばらみ期と穂揃期に散布する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- アルカリ性薬剤との混用はさける。

【安全対策上の注意】……………

- 眼に対して刺激性がある。
- 皮膚に対して刺激性がある。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- 空中散布及び無人航空機散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。



【適用と使用法】……………

作物名	適用病害名 又は使用目的	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	イソプロチオランを 含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 稲こうじ病	1000倍	60～ 150 ℓ	14日前まで	2回以内	散布	3回以内 (移植前は1回 以内、本田で は2回以内)
	いもち病	300倍	25 ℓ			空中散布	
		30倍	3 ℓ			無人航空機に よる散布	
	登熟歩合向上	8倍	800 ml	穂ばらみ期 ～穂揃い期 但し、収穫 14日前まで		散布	
みかん	着色促進	2000～ 3000倍	200～ 700 ℓ	収穫20～ 30日前まで	1回	立木全面散布 又は枝別散布	1回
きく	白さび病	1000倍	100～ 300 ℓ	発病初期	5回以内	散布	5回以内 (浸漬は1回以内)