

クレトジム乳剤 セレクト乳剤	取扱メーカー： 北興、ホクサン、アリスタ LS 原体メーカー： アリスタ LS
成分： クレトジム……………24.0% その他 PRTR 該当成分： ナフタレン〔PRTR・1種〕……………6.8% 1,2,4-トリメチルベンゼン〔PRTR・1種〕……………1.2%	性状： 黄赤色澄明可乳化油状液体 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第2石油類(非水溶性)・危険等級III

【品目特性】……………

- 広範囲の一年生イネ科雑草全般にわたって優れた効果を示す。
- 従来のイネ科雑草防除用茎葉処理剤では防除困難なスズメノカタビラにも優れた効果を示す。
- いね科植物と非いね科植物との間に極めて高い選択性があるので、あずき、てんさいなど、広葉作物に安心して使用できる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 散布液の調製に当っては、使用の直前に希釈し良くかき混ぜてから使用する。
- イネ科雑草優占の圃場で使用する。広葉雑草及びカヤツリグサ科雑草などが混在する場合は、これらの雑草に有効な除草剤との体系で使用する。

- 雑草茎葉にかかるよう、まきムラのないように均一に散布する。
- やや遅効性であり、イネ科雑草を完全に枯殺するまでに通常1週間から2週間前後を要するので、誤ってまき直しなどしないように注意する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 展着剤を加用するとより一層効果的である。
- イネ科雑草の生育期に有効であるが、雑草が大きくなりすぎると効果が劣るので、時期を逸しないように均一に散布する。
- 激しい降雨の予想される場合は使用をさける。
- 適用外作物（いね科作物、牧草など）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………



【適用と使用法】

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		本剤の 使用回数	使用 方法	クレドジムを 含む農薬の 総使用回数
			薬量	希釈水量			
あ　　ず　　き	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期)	35～50 <i>ml</i>	100 ℓ	1　回		1　回
	スズメノカタビラ	収穫45日前まで	50～75 <i>ml</i>				
いんげんまめ	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期)	35～50 <i>ml</i>				
	スズメノカタビラ	収穫60日前まで	50～75 <i>ml</i>				
だ　　い　　ず	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期)	35～50 <i>ml</i>				
		雑草生育期 (イネ科雑草5～8葉期)	50～75 <i>ml</i>				
	雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期)	収穫50日前まで					
	スズメノカタビラ	雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期)					
え　だ　ま　め	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草5～8葉期)	収穫14日前まで				
		雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期)	35～50 <i>ml</i>				
	スズメノカタビラ	雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期)	収穫14日前まで				
て　ん　ざ　い	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草5～8葉期)	50～75 <i>ml</i>				
		雑草生育期 (イネ科雑草5～8葉期)	35～50 <i>ml</i>				
	シバムギ レッドトップ スズメノカタビラ	雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期)	50～75 <i>ml</i>				
		雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期)			収穫30日前まで		
かん　し　ょ	一年生イネ科雑草	雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期)	収穫100日前まで				
キャベツ ね　　ぎ だいこん かぼちゃ ひまわり(種子) ばれいしよ		雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期)	50～75 <i>ml</i>				
		雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期)	収穫30日前まで				
		雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期)	収穫21日前まで				
たまねぎ		雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期)	3回 以内		3回 以内		
にんじん		雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期)	1　回		1　回		
にんにく		雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期)	2回 以内		2回 以内		
アスパラガス		雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期)					
			収穫前日まで				

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		本剤の 使用回数	使用 方法	クレトジムを 含む農薬の 総使用回数
			薬量	希釈水量			
かのこそう	一年生イネ科雑草	雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期) 収穫45日前まで	75mℓ	100ℓ	1回	雑草 茎葉 散布	1回
だ い お う		雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期) 収穫14日前まで			3回 以内	又は 全面 散布	3回 以内
い ぐ さ	水田一年生イネ科雑草	落水後雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期) (入水15日前まで)				雑草 茎葉 散布 又は 全面 散布 (落水)	