

<b>CYAP粉剤</b> <b>サイアノックス粉剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> 協友アグリ，住友化学  <b>原体メーカー：</b> 住友化学
<b>成分：</b> CYAP〔有機リン系〕……………3.0%	<b>性状：</b> 類白色粉末45μm以下  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

- 食葉性チョウ目害虫及び吸汁性害虫であるアブラムシ類などに対し，速効的に作用する。
- 残効性は中程度である。
- 浸透移行性はあまりない。
- 殺卵効果もある。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- コナガ，アオムシ，ヨトウムシに使用する場合には若齢幼虫のうちに散布する。

- 使用量は作物体の大きさに応じて所定薬量内で増減し，特に稚苗期の苗には薬害を生じるおそれがあるので少なめにする。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 適用作物（はくさい）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

- 共通注意事項7．ミツバチに対する注意事項を参照。



### 【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤及びCYAPを 含む農薬の総使用回数	使用方法
かぶ キャベツ はくさい だいこん	アオムシ アブラムシ類 コナガ ヨトウムシ若齢幼虫	3～5 kg	21日前まで	2回以内	散布
			14日前まで		
きゅうり	アブラムシ類	3～4 kg	収穫開始 3日前まで		
だいず	マメシクイガ ウコンノメイガ アブラムシ類	4 kg	7日前まで		