

シアントラニプロロール水和剤 ベリマーク SC	取扱メーカー： クミカ、日曹 原体メーカー： FMC
成分： シアントラニプロロール〔アントラニリックジアミド系〕…18.7%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】

●咀嚼性害虫（チョウ目、ハエ目、コウチュウ目）と吸汁性害虫（カメムシ目、アザミウマ目）等の広範囲な害虫に卓効を示す。

●主に害虫の摂食により薬剤が取り込まれ、速やかに摂食活動を停止させる。

●害虫の卵（産卵数の低下等）、各幼虫令期及び成虫にも効果を示すので、灌注処理した場合、害虫の複数ステージに影響を与え害虫個体群を経済的許容水準以下に維持する。

●灌注処理すると薬剤は根から吸収されて作物の導管を通して地上部に移行し、処理後約3～4週間の残効を示す。

●灌注処理により天敵、訪花昆虫への安全性をより高くしており、I P Mプログラムに組み込むことが可能である。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

●使用液量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせて調節する。

●過度の連用をさけ、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせる使用とする。

【薬効・薬害等の注意】

●薬液調製後はできるだけ速やかに使用する。

●石灰など、アルカリ性肥料との同時施用はさける。

●共通注意事項8、適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】

●水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。

●散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。

【適用と使用方法】

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	シアントラニプロール を含む農薬の総使用回数	
キャベツ	ハスモンヨトウ アザミウマ類 アブラムシ類 コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ ネキリムシ類 ウワバ類	400 倍	セル成型育苗 トレイ1箱又は ペーパーポット 1冊（約30×60 cm, 使用土壌約 1.5～4ℓ）当り 0.5ℓ	育苗期後 半～定植 当日	1 回	灌注	4回以内 （定植時までの 処理は1回 以内, 定植後の 散布は3回 以内）	
はくさい	アブラムシ類 コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ カブラハバチ							
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 アザミウマ類 ハイマダラノメイガ							
レタス 非結球レタス	オオタバコガ ハモグリバエ類 ハスモンヨトウ アブラムシ類 ヒメフタテンヨコバイ ウワバ類							
ねぎ	タマネギバエ タネバエ ネキリムシ類 シロイチモジヨトウ アザミウマ類 ハモグリバエ類	2000倍	0.5ℓ/m ²	収穫7日 前まで		株元 灌注	4回以内 （定植時までの 処理は1回 以内, 定植後の 処理は3回 以内（但し, 株元灌注は1 回以内））	
	シロイチモジヨトウ アザミウマ類 ハモグリバエ類							
カリフラワー	アオムシ コナガ ハスモンヨトウ	400 倍	セル成型育苗 トレイ1箱又は ペーパーポット1 冊（約30×60cm, 使用土壌約1.5 ～4ℓ）当り0.5ℓ	育苗期後 半～定植 当日		株元 灌注	灌注	1 回
ほうれんそう	ハスモンヨトウ シロオビノメイガ	4000倍	0.2ℓ/m ²	収穫7日 前まで				
いちご	ハスモンヨトウ アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	1000倍	50ml / 株	育苗期後 半～定植 当日			灌注	4回以内 （灌注は1回 以内, 散布は 3回以内）
非結球あぶら な科葉菜類 （にまつなを除く）	アオムシ コナガ アブラムシ類	4000倍	0.2ℓ/m ²	収穫7日 前まで			株元 灌注	1 回

作物名	適用害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
ト マ ト ミニトマト	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類	400 株 当り 25 ml	400 株当り 10～20 ℓ (1 株当り 25～50 ml)	育苗期後 半～定植 当日	1 回	灌注	4 回以内 (定植時までの 処理は 1 回以 内、定植後の 散布は 3 回以 内)
きゅうり	アブラムシ類		400 株当り 2～20 ℓ (1 株当り 5～50 ml)				
	ハモグリバエ類 アザミウマ類 コナジラミ類		400 株当り 10～20 ℓ (1 株当り 25～50 ml)				
ピーマン	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類						
なす	コナジラミ類 アブラムシ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 ネキリムシ類						
	メロン すいか		アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類				400 株当り 10 ℓ (1 株当り 25 ml)
ししとう							