

<b>アミトラズ乳剤</b> <b>ダニカット乳剤20</b>	<b>取扱メーカー：</b> 日産、日農、琉産  <b>原体メーカー：</b> アリスタ LS
<b>成分：</b> アミトラズ〔PRTR・1種〕……………20.0% <b>その他 PRTR 該当成分：</b> キシレン〔PRTR・1種〕……………41%〈37～47%〉 エチルベンゼン〔PRTR・1種〕……………33%〈26～37%〉	<b>性状：</b> 淡黄褐色透明可乳化油状液体  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級Ⅲ

### 【品目特性】……………

- 接触作用が高く速効的である。
- ハダニの成虫、幼虫、卵いずれのステージにも効果がある。
- みかんのサビダニ、ロウムシ類を併殺できる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 〈みかん〉
- 夏ダニ対象に年1回散布とし、他のダニ剤とのローテーションを組む。
- 〈りんご・なし〉
- 年1回散布し、他のダニ剤とのローテーションを組む。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 石灰硫黄合剤、ボルドー液などアルカリ性薬剤との混用はさける。

### 【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用時期 (収穫前)	本剤及びアミトラズを含む農薬の総使用回数	使用方法
み か ん	ミカンハダニ	1000 ～	14 日前まで	1 回	散布
	ミカンサビダニ	1500 倍			
	ロウムシ類幼虫	1000 倍			
か ん き つ (みかんを除く)	ミカンハダニ	1000 ～	60 日前まで		
	ミカンサビダニ	1500 倍			
	ロウムシ類幼虫	1000 倍			
り ん ご	リンゴハダニ	800 ～ 1000 倍	30 日前まで		
な し	ハダニ類 (ナミハダニを除く)				
き く ば ら	ハダニ類	800 倍	開花前	2 回以内	
カーネーション			蕾の開裂前		

- ナミハダニの発生の多い園での使用はさける。
- ハダニ類は繁殖が早いので、かけ残しのないよう丁寧に散布する。
- カーネーションの花弁に対して薬害（縮れ）のおそれがあるので必ず蕾の開裂前に使用する。

### 【安全対策上の注意】……………

- 共通注意事項7、ミツバチに対する注意事項を参照。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。

