

<b>フロニカミド水和剤</b> <b>ウララD F</b>	<b>取扱メーカー：</b> 石原，ホクサン  <b>原体メーカー：</b> 石原産業
<b>成分：</b> フロニカミド……………10.0%	<b>性状：</b> 淡褐色水和性細粒 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

- 新規系統の殺虫剤であり，既存剤に対する感受性が低下した害虫に対しても優れた効果を示す。
- アブラムシ類，コナジラミ類などのカメムシ目害虫や，アザミウマ類に対して殺虫効果を示す。特にアブラムシ類に対しては種に関わらず高い効果を示す。
- 高い浸透移行性を有し，葉表から葉裏，あるいは巻葉内や新梢へも移行するので，果樹のアブラムシ防除にも適している。
- 有効成分は植物体中に速やかに取り込まれるため，残効性，耐雨性に優れる。
- カブリダニ類，寄生蜂などの天敵昆虫や，ミツバチ，マルハナバチなどの訪花昆虫にほとんど影響なく，IPM 防除体系の一剤として適する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- アブラムシ類の吸汁を阻害し衰弱死に至らせるまでに，見かけ上は数日かかるが，吸汁阻害は速効的であり，同時に害虫の加害活動も停止する。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 散布量は，対象作物の生育段階，栽培形態及び散布方法に合わせ調節する。
- つまみ菜，間引き菜には使用しない。
- 適用作物（きゅうり，すもも）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

### 【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	フロニカミドを含む 農薬の総使用回数
りんご	リンゴワタムシ	2000 倍	200 ～ 700 ℓ	14 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
	アブラムシ類	2000 ～ 4000 倍					
なし	チャノキイロアザミウマ	2000 倍		7 日前 まで			
かき	アブラムシ類	2000 ～ 4000 倍		開花前 まで			
ネクタリン 小粒核果類	チャノキイロアザミウマ	1000 倍		前日まで			
ぶどう	チャノキイロアザミウマ	2000 倍	60 ～ 150 ℓ	7 日前 まで			
おうとう	チャノキイロアザミウマ コアオカスミカメ	4000 倍					
小麦	アブラムシ類	4000 倍					

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	フロニカミドを含む 農薬の総使用回数						
い　　ち　　ご	アブラムシ類	2000～ 4000倍	100～ 300 ℓ	前日まで	2回以内	散布	2回以内						
	コナジラミ類	2000倍											
き　　ゆ　　う　　り	アブラムシ類	2000～ 4000倍			3回以内		3回以内	3回以内					
	コナジラミ類	2000倍											
な　　　　　す ト　　マ　　ト ミニトマト	アブラムシ類	2000～ 4000倍											
	コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマ	2000倍											
し　　し　　と　　う	アブラムシ類	2000～ 4000倍		7日前 まで					2回以内	2回以内			
ビ　ー　マ　ン す　　い　　か													
か　　ぼ　　ち　　や													
うり類(漬物用) に　　が　　う　　り													
アスパラガス	アブラムシ類 ネギアザミウマ	2000倍		100～ 300 ℓ	前日まで		3回以内	3回以内					
セ　ル　リ　ー	アブラムシ類	4000倍			7日前 まで			2回以内	2回以内				
エンダイブ		2000倍								前日まで	2回以内	2回以内	
レ　　タ　　ス 非結球レタス パ　　セ　　リ		2000倍											
ほうれんそう な　　ば　　な　　類 し　　ゆ　　ん　　ぎ　　く		4000倍			3日前 まで			3回以内	3回以内				
未成熟とうもろこし		2000～ 4000倍								前日まで		3回以内	3回以内
ズ　　ッ　　キ　　ー　　ニ オ　　ク　　ラ		2000倍											
メ　　ロ　　ン		2000～ 4000倍			前日まで			3回以内	3回以内				
		コナジラミ類	2000倍										
ば　れ　い　し　よ		アブラムシ類	2000～ 4000倍							25 ℓ	7日前 まで	2回以内	2回以内
			500倍										
			1000倍										
さ　　と　　い　　も や　　ま　　の　　い　　も や　　ま　　の　　い　　も(むかご) こ　　ん　　に　　や　　く	2000倍		100～ 300 ℓ	前日まで									
え　　だ　　ま　　め い　　ん　　げ　　ん　　ま　　め だ　　い　　ず　　ぎ あ　　ず　　ぎ	2000～ 4000倍												
さやえんどう さやいんげん 実えんどう													

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	フロニカミドを含む 農薬の総使用回数
たまねぎ	ネギアザミウマ	2000倍	100～ 300ℓ	7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
ねぎ		1000～ 2000倍		前日まで	3回以内		3回以内
くわい	アブラムシ類	2000倍		21日前 まで			
非結球あぶら な科葉菜類		4000倍		前日まで			
すいぜんじな				7日前 まで			
キャベツ はくさい ブロッコリー		2000～ 3000倍		前日まで			
だいこん		2000倍		14日前 まで			
カリフラワー				7日前 まで			
ごぼう		2000～ 4000倍		3日前ま で 但し、 伏せ込み 栽培は伏 せ込み前 まで			
みつば				3日前 まで			
しそ		4000倍		14日前 まで			
てんさい		2000～ 4000倍		7日前 まで			
食用ぎく		4000倍		3日前 まで			
食用ミニバラ		2000倍		14日前 まで			
きく（葉）		4000倍		3日前 まで			
おかひじき				3日前 まで			
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ ツマグロアオカスミカメ	1000～ 2000倍	200～ 400ℓ	摘採7日 前まで	1回		1回
	コミカンアブラムシ	2000倍					