

|  |  |
|--|--|
| <b>ベンフラカルブ・プロベナゾール粒剤</b><br><b>ジャッジ箱粒剤</b>                     | <b>取扱メーカー：</b><br>O A T, Meiji, 琉産<br><br><b>原体メーカー：</b><br>O A T, Meiji |
| <b>成分：</b> ベンフラカルブ〔カーバメート系 PRTR・1 種〕…5.0%<br>プロベナゾール……………24.0% | <b>性状：</b> 類白色細粒<br><br><b>毒性：</b> 普通物<br><b>消防法：</b> ——                 |

**【適用と使用方法】** ……………

| 作物名        | 適用病害虫名  | 1 箱*当り<br>使用量 | 使用時期             | 使用方法                    | 総使用回数  |
|------------|---|---------------|------------------|-------------------------|--|
| 稲<br>(箱育苗) | いもち病<br>もみ枯細菌病<br>白葉枯病<br>イネミズゾウムシ<br>イネドロオイムシ<br>ツマグロヨコバイ<br>イネヒメハモグリバエ<br>ヒメトビウンカ<br>セジロウンカ<br>ニカメイチュウ第 1 世代<br>イネシンガレセンチュウ | 50 g          | 移植前 3 日<br>～移植当日 | 育苗箱の上<br>から均一に<br>散布する。 | 本剤 1 回<br>ベンフラカルブ 1 回<br>プロベナゾール 2 回以内<br>(移植時までの処理は 1<br>回以内) |

\* 育苗箱は 30×60×3 cm, 使用土壌約 5 ℓ