

アベイル粒剤

成分：アセタミプリド〔ネオニコチノイド系〕……………0.25%

シアントラニプロール〔ジアミド系〕……………0.50%

毒性：普通物

【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセタミプリドを含む農薬の総使用回数	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数
なす すいか	コナジラミ類 アブラムシ類 アザミウマ類	2g/ 株	育苗期 後半～ 定植 当日	1 回	株元 散布	4 回以内 (粒剤の定植 時までの処理 は 1 回以内、 散布、くん煙 及び定植後の 株元散布は合 計 3 回以内)	1 回
トマ ミニトマト	コナジラミ類 アブラムシ類 ハモグリバエ類					4 回以内 (定植時まで の処理は 1 回 以内、定植後 の散布は 3 回 以内)	4 回以内 (定植時まで の処理は 1 回 以内、定植後 の散布は 3 回 以内)
きゅうり	コナジラミ類 アブラムシ類 アザミウマ類					5 回以内 (粒剤の定植 時までの処理 は 1 回以内、 2% 粒剤の定 植後の株元 散布は 1 回以 内、散布、く ん煙及び 1% 粒剤の株元散 布は合計 3 回 以内)	
ピーマン	コナジラミ類 アブラムシ類 アザミウマ類 コガネムシ幼虫					3 回以内 (粒剤の定植 時までの処理 は 1 回以内、 散布、くん煙 及び定植後の 株元散布は合 計 2 回以内)	
キャベツ	アブラムシ類 コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ネギアザミウマ ハイマダラノメイガ					6 回以内 (粒剤の定植 時までの処理 は 1 回以内、 散布及び定植 後の株元散布 は合計 5 回 以内)	

作物名	適用害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	アセタミプリドを含む農薬の総使用回数	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数
は く さい	ハイマダラノメイガ アブラムシ類 コナガ アオムシ	セル成型育苗 トレイ1箱又は ペーパーポット 1冊（約30×60 cm，使用土壌約 1.5～4ℓ）当 り40g	育苗期 後半～ 定植 当日	1 回	株元 散布	4回以内 （粒剤の定植 時までの処理 は1回以内， 散布及び定植 後の株元散布 は合計3回 以内）	4回以内 （定植時まで の処理は1回 以内，定植後 の散布は3回 以内）
ブロッコリー	アオムシ アブラムシ類 ネギアザミウマ コナガ ハスモンヨトウ					4回以内 （粒剤の定植 時までの処理 は1回以内， 散布は3回 以内）	1 回
カリフラワー	アオムシ ハスモンヨトウ					4回以内 （粒剤の株元 散布は1回以 内，散布は 3回以内）	4回以内 （定植時まで の処理は1回 以内，定植後 の散布は3回 以内）
レ タ ス	オオタバコガ ヨトウムシ アブラムシ類 ナモグリバエ					2回以内 （粒剤の株元 散布は1回以 内，散布は 1回以内）	4回以内 （定植時まで の処理は1回 以内，定植後 の散布は3回 以内）
非結球レタス						3回以内 （は種時の土 壌混和は1回 以内，植付時 の土壌混和及 び定植当日 までの株元散 布は合計1回 以内）	4回以内 （定植時まで の処理は1回 以内，定植後 の処理は3回 以内（但し， 株元灌注は 1回以内））
ね ぎ	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ シロイチモジヨトウ						

〔取扱メーカー〕 日本曹達