

<b>ニコスルフロン乳剤</b> <b>ワンホープ乳剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> 石原、ホクサン  <b>原体メーカー：</b> 石原
<b>成分：</b> ニコスルフロン〔スルホニルウレア系〕……………4.0%	<b>性状：</b> 類白色粘稠懸濁液体 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> 可燃性液体類

### 【品目特性】……………

- 飼料用とうもろこしに対して高い選択性を持ち、とうもろこしの生育期（3～5葉期）に雑草茎葉散布が可能。
- 一年生イネ科雑草、一年生広葉雑草、また難防除のシバムギ、レッドトップなどの多年生イネ科雑草まで効果を示す。
- 従来の土壌処理型除草剤と比べ、土壌条件、処理後の気象条件による除草効果の変動が少なく、安定した効果を発揮する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 土壌処理効果はないため、飼料用とうもろこし3～5葉期の雑草生育期に散布する。
- 雑草が大きくなりすぎると除草効果が低下するため、早めの散布を行う。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 有機リン系殺虫剤との混用及び7日以内の近接散布は、薬害を生じることがあるのでさける。
- 散布数日後、一時的に退色及び生育抑制を生じることがあるが、その後の生育、収量には影響しない。
- 散布前後一週間以内の中耕は、除草効果を低下させるのでさける。
- 散布直後の降雨は、効果を低下させるので、天候を見極めて散布する。
- 品種によって強い薬害が発生することがあるので、必ず使用前に最新の適用品種一覧表を確認する。

### 〈適用品種一覧（2020年3月末現在）〉

#### ○バイオニアデント

34N84, 36B08, 39B29, 39H32, 39K56,  
 ＊39T45（＊北海道のみ適用可。北海道以外では使用不可）、P0640, P0704, P0725,  
 P1063, P1204, P1543, P1690, P2088,  
 P2105, P7631, P8025, P9027, P9074,  
 P9400

#### ○Z－Corn

Z105, Z112, Z115, Z118, Z120, Z125,  
 Z750α, Z800α, Z850α, Z870α, Z900α,  
 Z950α

#### ○ロイヤルデント

TH058, TH1146, TH1222, TH13103,  
 TH1315, TH1515, TH860, TH922,  
 TX1162, TX1235, TX1277, TX1334,  
 フレック85 (TH1475), プロフィ95 (TH13101),  
 ベネット95

#### ○ゴールドデント

KD254, KD277, KD301, KD320, KD376,  
 KD418, KD420, KD419, KD460, KD502,  
 KD551, KD580, KD641, KD671, KD731,  
 KD777NEW, KD085ペローナ, KD090カリス,  
 KD106エダム

#### ○グリーンデント

115 (JG1159)

#### ○スノーデント

110 (LG30500), 110 (LG3520),  
 115 (SH4681), 115ボラリス (SM8446),  
 118R (SH5702), 118S (SH3786),  
 118シルマ (SM1023), 122レオ (SM8490),  
 125T (SH2821), LG3490, SH4812 (SH4812)

#### ○ニューデント

75 (LG30213), 75 (LG3215),  
 78ソリード (Anjou227), 80ビビッド,

- 85エリオット, 85ビビアン, 85 (LG31237),  
90 (LG3264), 95 (DKC34-20),  
100 (LG3457), 105 (LG2533), LG3490
- ネオデント  
\*アシル90(SH1353)(\*は北海道のみ適用可。  
北海道以外では使用不可),  
エスパス95 (SL0746), クロノス90 (SL12029)
- サイレージコーン  
NS115スーパー, NS118スーパー,  
NS125スーパー, NS129スーパー
- ファームデント  
75日 (FD21-68), 80日 (FD26-72),  
85日 (FD30-66), 88日 (FD34-66),  
90日 (FD36-62), 90日 (FD36-77),  
97日 (FD43-87), 100日 (FD47-85),  
105日 (FD51-76), 110日 (FD58-27),  
115日 (FD61-58), 120日 (FD66-91)

- クミアイデント  
105, 113
- アンボール, エスパーS-8812, おおぞら,  
きみまる, きよら, コビー, コロサリス,  
シャンティ, セバスト, タカネスター,  
タカネフドウ, たちびりか, チベリウス,  
ブリザック, 北交65号, メルクリオ,  
ゆめそだち, ゆめちから, ゆめつよし,  
95日タラニス, 100日トアレグ,  
110日テクトニス

【安全対策上の注意】 .....



【適用と使用法】 .....

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		本剤の 使用回数	使用 方法	ニコスルフロンを含 む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
飼料用 とうもろこし	一年生雑草 多年生イネ科雑草	とうもろこし 3～5 葉期 但し, 収穫 30 日前まで	100～ 150 ml	70～ 100 ℓ	1 回	雑草 茎葉 散布	1 回