

フルセトスルフロン粒剤 ヒエクッパエース1キロ粒剤	取扱メーカー： 石原 原体メーカー： 石原産業
成分： フルセトスルフロン〔スルホニルウレア系〕………0.33%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】 ……………

●「1成分」でノビエの他、ヒルムシロやウリカワなどに対しても高い除草効果を示す中後期除草剤。(但し、スルホニルウレア抵抗性雑草に対しては効果が期待できない。)

●移植14日後からノビエ5葉期までの幅広い時期に使用でき、圃場に応じた体系防除が可能。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】 ……………

●共通注意事項の5、水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。

●前処理剤との体系で使用する。

●移植水稲及び直播水稲に使用する場合は使用時期はノビエの5葉期までなので、時期を失しないように散布する。

●多年生雑草は、生育段階によって効果にフレがあるので必ず適期に散布する。

〈移植水稲〉

雑草名	散布適期
ウリカワ ヘラオモダカ	4葉期まで
ヒルムシロ	発生期まで
クログワイ コウキヤガラ シズイ	草丈15cm まで

〈直播水稲〉

雑草名	散布適期
ウリカワ	4葉期まで

●クログワイ、コウキヤガラ、シズイは生育段階によって効果にフレがあるので、必要に応じて有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

【薬効・薬害等の注意】 ……………

●共通注意事項の5、水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。

●適用作物（水稲）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

●適用外作物（いぐさ、れんこん、くわい、せり）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】 ……………

●無人ヘリコプター散布の際は、共通注意事項の2、空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

【適用と使用法】

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	ノビエ マツバイ ウリカワ ヒルムシロ ヘラオモダカ クログワイ コウキヤガラ シズイ	移植後14日～ ノビエ5葉期 但し、 収穫45日前まで	1kg	湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布	2回以内 ※
直播水稻	ノビエ ウリカワ	稲2葉期～ ノビエ5葉期 但し、 収穫45日前まで			

※フルセトスルフロンを含む農薬の総使用回数：2回以内