ピリダリル水和剤 プレオフロアブル	取扱メーカー: 協友アグリ, サンケイ*, ホクサン, 住友化学 原体メーカー: 住友化学
成分:ピリダリル・・・・・10.0%	性状:類白色水和性粘稠懸濁液体
	毒性: 普通物 消防法: ——

- ●既存の殺虫剤に対して薬剤抵抗性を発達させた 害虫にも,感受性系統と同様に高い殺虫活性を示 す。
- ●チョウ目及びアザミウマ目害虫に対して高い防 除効果を示す。チョウ目害虫に対しては速効的に 作用し、中~老齢期幼虫に対しても高い殺虫活性 を示す。
- ●散布後の降雨の影響が少なく残効性に優れる。
- ●天敵・有用昆虫に対する影響が極めて小さく、総合的病害虫管理(IPM)に適合している。ハナカメムシ類、寄生蜂、カブリダニ類などの天敵を利用した防除体系への組み込み、ミツバチやマルハナバチなどの花粉媒介昆虫との併用が可能である。
- ●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一 覧表」を参照。

【使用上のポイント】…………

- ●使用前にはボトルをよく振る。
- ●かけムラのないように丁寧に散布する。

【薬効・薬害等の注意】 …………

●散布液調製後はそのまま放置せず,できるだけ 速やかに散布する。

【安全対策上の注意】 ……………

- ●無人航空機散布の際は、共通注意事項の2.空中散布及び無人航空機(無人ヘリコプター等)による散布・滴下に関する注意事項を参照。
- ●甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので, 使用 時は注意。





【適用と使用法】…

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤及びピリダリルを 含む農薬の総使用回数	使用方法
キャベツ	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハイマダ類 コナガ アオムシ ヨトカシシ	1000倍	100 ~ 300 ℓ	7日前まで	2回以内	散布
だいこん	コトリムシ オオタバコガ コナガ アオムシ ヨトウムシ カブラハバチ			14日前まで		

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤及びピリダリルを 含む農薬の総使用回数	使用方法
かぶ			1人171人主	3日前まで		
にんじん	ハスモンヨトウ			前日まで		
ごぼう						
	ナモグリバエ					
レタス	ハスモンヨトウ					
	オオタバコガ					
	アザミウマ類					
立ちちしゃ	ナモグリバエ	1000倍		7日前まで	2回以内	
リーフレタス	ハスモンヨトウ					
-1:4:1:4: × > >	オオタバコガ					
非結球あぶらな科葉菜類						
(こまつな,みずな,	コナガ					
なばな類を除く)	ハスモンヨトウ					
こまつな	7 · = · · · · /					
みずな						
すいぜんじな	ハスモンヨトウ	2000倍]			
	ハスモンヨトウ					
なす	オオタバコガ				4回以内	
,	アザミウマ類			前日まで	10011	
	ハモグリバエ類					
トマト	ハスモンヨトウ					
ミニトマト	オオタバコガ ハモグリバエ類		100			
ピーマン	タバコガ類		100 ~ 300 ℓ		2回以内	
とうがらし類	アザミウマ類		300ℓ		- 2回以内	
	コナガ					散布
なばな類	ハスモンヨトウ			14日前まで		
do 34°	シロイチモジヨトウ				4 EUU #	
ね ぎ	ネギアザミウマ				4回以内	
	ハスモンヨトウ			3日前まで		
たまねぎ	シロイチモジヨトウ		2回以内			
	ネギアザミウマ					
いちご	ハスモンヨトウ	1000 #		前日まで	4回以内	
	オオタバコガ	1000倍				
カリフラワー	コナガハスモンヨトウ			3日前まで		
	ヨトウムシ			O LIM & C		
	コナガ					
ブロッコリー	ハスモンヨトウ			7日前まで		
茎ブロッコリー	ハスモンヨトウ			3日前まで	1	
未成熟とうもろこし	オオタバコガ					
オクラ	オオタバコガ			前日まで	2回以内	
4 2 7	ハスモンヨトウ					
きゅうり	ハモグリバエ類					
メロン	アザミウマ類					
	ウリノメイガ					
とうがん	ミナミキイロアザミウマ					
	ハスモンヨトウ		100 -			
アスパラガス	オオタバコガョトウムシ		100 ∼ 500 ℓ			
	ネギアザミウマ					
<u> </u>	11//5/1					

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤及びピリダリルを 含む農薬の総使用回数	使用方法	
に ら	ネギアザミウマ		1				
しゅんぎく	ハスモンヨトウ						
セルリー	ハスモンヨトウ						
C /V /	ハモグリバエ類						
	ハスモンヨトウ						
すいか	オオタバコガ	1000倍		前日まで			
1- 1× = h	アザミウマ類						
にがうり	ハスモンヨトウ						
ほうれんそう	ハモグリバエ類						
しょうが	ハモケリハエ頬						
C 1 / N-	ハスモンヨトウ	1000~	_				
	シロイチモジヨトウ	2000年	100∼			散布	
豆類(未成熟)	ハモグリバエ類		300 ℓ				
	オオタバコガ	1000倍					
豆 類	ハスモンヨトウ	1000~			-		
(種実, 但し,	シロイチモジヨトウ	2000倍					
だいず,							
らっかせいを	オオタバコガ	1000倍					
除く)	ハモグリバエ類						
	ハスモンヨトウ	1000∼					
	マメシンクイガ	2000倍					
	シロイチモジヨトウ		800 ml	7日前まで			
だいず	オオタバコガ	1000倍			2回以内		
·	ハモグリバエ類					And I the other	
	ハスモンヨトウ	8~16倍				無人航空機による	
	ハスモンコトリ					放による	
	オオタバコガ	1000倍				HX-11	
ばれいしょ		1000∼					
13. 7	ハスモンヨトウ	2000倍	-				
	ナカジロシタバ	1000倍					
かんしょ							
5-1)	ハスモンヨトウ	1000~	000~ 000倍				
さといも	スズメガ類	2000倍					
	ハスモンヨトウ	1000倍		前日まで			
そ ば	ヨトウムシ	1000~ 2000倍	1				
	コトリムシ		100~				
しそ			300 ℓ			散布	
しそ(花穂)	ハスモンヨトウ		"""	7日前まで			
バジル	/ / /	1000倍		7 11113 (
タラゴン			0.0 (1)				
さんしょう	アゲハ類			21日前まで			
(葉)			1000倍		フロ並える	_	
食用ぎく きく(葉)	オオタバコガ				7日前まで		
き く (葉) 食用ミニバラ	ハフエンコしら			14日前まで			
花き類・	ハスモンヨトウ オオタバコガ			前日まで			
起葉植物	ハスモンヨトウ			発生初期	4回以内		
	ハハモマコドリ		L	L	I	<u> </u>	