

ピリフタリド・メソトリオン・メタゾスルフロン粒剤 アクシズ MX 1 キロ粒剤	取扱メーカー： シンジェンタ 原体メーカー： シンジェンタ，シンジェンタ，日産
成分： ピリフタリド……………2.4% メソトリオン〔トリケトン系〕……………0.90% メタゾスルフロン〔スルホニルウレア系〕……………0.80%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

●移植水稻の移植7日後～ノビエ4葉期まで又は直播水稻の稲1葉期～ノビエ4葉期までと散布適期が幅広い。

●一年生雑草から多年生雑草まで幅広い草種に安定した効果を示す。

●スルホニルウレア系除草剤抵抗性のイヌホタルイ、コナギ等に高い効果を示す。

●ノビエに対し土壌や環境要因に影響されにくい安定した活性を有する。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

●共通注意事項の5. 水稻除草剤散布 使用上のポイントを参照。

●雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの4葉期までに時期を失しないように散布する。

●多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布する。

●特にオモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のもものでは十分な効果を示さないので、有効な後処理剤と組み合わせる。

●田植前あるいは、は種前に生育したミズガヤツリは、完全に防除してから使用する。

雑草名	散布適期
オモダカ	矢じり葉1葉期まで
ヘラオモダカ	3葉期まで
ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ	4葉期まで
クログワイ コウキヤガラ シズイ	草丈10cmまで
ヒルムシロ	発生期まで
セリ	再生始期まで

【薬効・薬害等の注意】……………

●共通注意事項の5. 水稻除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。

●直播水稻の場合は、以下に注意する。

○散布は湛水条件で行う。

○稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので注意する。

○散布後に異常低温が予測される場合は、薬害を生じるおそれがあるので注意する。

●いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これら作物の生育期に隣接田で使用する場合は、十分注意する。

●いぐさの栽培予定水田では使用しない。

●適用外作物（いぐさ、れんこん、せり、くわい）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

●無人ヘリコプター散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

【適用と使用方法】

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ クログワイ オモダカ シズイ コウキヤガラ	移植後7日～ ノビエ4葉期 但し、 収穫45日前まで	1 kg	湛水散布	1回※
				無人ヘリコプター による散布	
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ4葉期 但し、 収穫45日前まで		湛水散布	
				無人ヘリコプター による散布	

※ピリフタリドを含む農薬の総使用回数：2回以内
 ※メソトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内
 ※メタゾスルフロンを含む農薬の総使用回数：2回以内