

エトフェンプロックス・トリシクラゾール・バリダマイシン・フェリムゾン粉剤 <b>ノンブラストレバリダ粉剤 DL</b>	<b>取扱メーカー：</b> 協友アグリ，サンケイ＊ <b>原体メーカー：</b> 三井アグロ，ダウ，住友化学， 住友化学
<b>成分：</b> エトフェンプロックス〔ピレスロイド系〕……………0.50% トリシクラゾール……………0.50% バリダマイシンA〔抗生物質〕……………0.30% フェリムゾン〔PRTR・1種〕……………2.0%	<b>性状：</b> 類白色粉末45μm以下， 浮遊性指数20以下 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

**【適用と使用方法】** ……………

作物名	適用病害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	使用 方法	総使用回数	
稲	いもち病 紋枯病 ごま葉枯病 穂枯れ（ごま葉枯病菌） 変色米（カーブラリア菌） ツマグロヨコバイ ウンカ類 コブノメイガ	3 ～ 4 kg	14 日 前 まで	散布	本剤	2 回以内
	カメムシ類	4 kg			エトフェンプロックス	3 回以内
					トリシクラゾール	4 回以内
					（育苗箱への処理は 1 回以内， 本田では 3 回以内）	
					バリダマイシン	6 回以内
					（育苗箱灌注は 1 回以内，本 田では 5 回以内）	
					フェリムゾン	2 回以内