



作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	イミノクタジンを含 む農薬の総使用回数	ポリオキシンを含む 農薬の総使用回数	
りんご	斑点落葉病 すす点病 すす斑病	1500～ 2000 倍	200～ 700 ℓ	21 日前 まで	3 回 以内	散布	8 回以内 (液剤及び水和 剤は合計 6 回 以内 (開花 期以降は 3 回 以内)、塗布剤 は 2 回以内)	5 回以内 (散布は 3 回以内)	
	うどんこ病 黒星病 褐斑病	1500 倍							
みかん	灰色かび病	750～ 1500 倍		開花期～ 幼果期			3 回以内	5 回以内	
	そうか病	1000 倍							
かんきつ (みかんを除く)	灰色かび病	750～ 1500 倍		21 日前 まで	2 回 以内			2 回以内	2 回以内
	そうか病	1000 倍							

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	イミノクタジンを含む 農薬の総使用回数	ポリオキシンを含む 農薬の総使用回数
なし	黒斑病	1500～ 2000 倍	200～ 700 ℓ	14 日前 まで	3 回 以内	散布	5 回以内 (塗布剤は 2 回 以内、液剤は 1 回以内)	5 回以内 (イミノクタ ジン酢酸塩・ ポリオキシ ン水和剤は 3 回以内)
	うどんこ病 輪紋病 黒星病	1500 倍						
	灰色かび病	750～ 1500 倍						
ぶ  ど う	黒とう病 晩腐病 褐斑病	1000 倍		60 日前 まで	2 回 以内		3 回以内 (休眠期は 1 回 以内、生育期 は 2 回以内)	5 回以内
	うどんこ病	1000～ 2000 倍						
	う め	灰色かび病 すす斑病 黒星病						
か き	うどんこ病 灰色かび病 炭疽病	1000～ 2000 倍		30 日前 まで	3 回 以内		3 回以内	3 回以内
	うどんこ病	2000 倍						
き ゅ う り	灰色かび病 褐斑病 ハダニ類 アザミウマ類	1000 倍		100～ 300 ℓ	前日まで		2 回 以内	7 回以内
	うどんこ病	1000～ 2000 倍	4 回 以内				4 回以内	5 回以内
	す い か	つる枯病 炭疽病 ハダニ類						
メ ロ ン	うどんこ病	1500～ 2000 倍	5 回 以内				5 回以内	5 回以内 (塗布は 1 回以内)
	つる枯病 ハダニ類 アザミウマ類	1500 倍						
	か ぼ ち ゃ	うどんこ病					1000～ 2000 倍	
な す	灰色かび病 うどんこ病 ハダニ類 アザミウマ類	1000 倍	前日まで		3 回 以内		3 回以内	3 回以内
	黒斑病 小菌核腐敗病 黄斑病 葉枯病 ネギアザミウマ	1500 倍						
ね ぎ	黒斑病 小菌核腐敗病 黄斑病 葉枯病 ネギアザミウマ	1500 倍	14 日前 まで		5 回 以内  3 回 以内			
たまねぎ	灰色腐敗病 灰色かび病	750～ 1000 倍	3 日前 まで				3 回以内	3 回以内
にんにく	葉枯病 黄斑病	1000～ 1500 倍						

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	イミノクタジンを含 む農薬の総使用回数	ポリオキシンを含む 農薬の総使用回数	
に ん じ ん	黒葉枯病 斑点病	1500～ 2000 倍	100～ 300 ℓ	14 日前 まで	5 回 以内	散布	5 回以内 (種子粉衣は 1 回以内, 無人 航空機散布は 2 回以内)	5 回以内	
花 き 類・ 観 葉 植 物 (ストック, スターチス, チューリップ, ばら, クルクマ, きくを除く)	灰色かび病	1000 倍		発病初期	8 回 以内		8 回以内	8 回以内	
ス ト ッ ク	菌核病 灰色かび病								
ス タ ー チ ス	うどんこ病 灰色かび病								
チューリップ	褐色斑点病 灰色かび病								
ク ル ク マ	灰色かび病 さび斑病								
き く	灰色かび病 白さび病								
ば ら	灰色かび病 うどんこ病	1000～ 2000 倍			3 回 以内		5 回 以内	3 回以内	3 回以内
樹 木 類 (かし,まさき, さるすべりを 除く)	うどんこ病 灰色かび病	1000 倍							
か し	灰色かび病 うどんこ病 紫かび病								
ま さ き さるすべり	うどんこ病 灰色かび病	1000～ 2000 倍 1000 倍							