

BPMC・MEP粉剤 スミバッサ粉剤20DL	取扱メーカー： 協友アグリ，住友化学 原体メーカー： 住友化学・日農，住友化学
成分： BPMC〔カーバメート系 PRTR・1種〕……………2.0% MEP〔有機リン系 PRTR・1種〕……………2.0%	性状： 類白色粉末45 μ m以下， 浮遊性指数20以下
	毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】……………

- ニカメイチュウとツマグロヨコバイ，ウンカ類との同時防除に用いられる。
- その他，スミチオン粉剤3DL，バッサ粉剤30DLの項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- イネミズゾウムシ成虫に使用する場合は，なるべく広域で一斉に散布し，畦畔など周辺雑草にも散布する。また，幼虫に有効な薬剤との体系で使用する事が望ましい。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 適用外作物（あぶらな科作物）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 共通注意事項7．ミツバチに対する注意事項を参照。
- 自動車，壁などの塗装面，大理石，御影石にかからないよう注意する。
- 魚類に低濃度でも影響を及ぼすので注意。
- 甲殻類に影響を及ぼすので，使用時並びに使用後も注意。



【適用と使用法】……………

作物名	適有害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	BPMCを含む農 薬の総使用回数	MEPを含む農 薬の総使用回数
稲	ニカメイチュウ ツマグロヨコバイ ウンカ類 カメムシ類	3～4 kg	21日前まで	2回以内 (但し， 出穂前は 1回)	散布	5回以内	3回以内 (種もみへの処 理は1回以内， 育苗箱散布は1 回以内，本田 では2回以内)
	イネミズゾウムシ成虫	4 kg					