



作物名	適用害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	イソキサチオンを含 む農薬の総使用回数
だいこん はつかだいこん	タネバエ ネキリムシ類	6 kg	は種時	1 回	土壌表面散布 土壌混和処理	1 回
はくさい キャベツ	ネキリムシ類		は種時 又は 植付時	2 回以内		4 回以内 (は種時は 1 回 以内、植付時は 1 回以内、植付 後は 2 回以内)
ねぎ						

作物名	適用害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	イソキサチオンを含 む農薬の総使用回数	
わ け ぎ あ さ つ き レ タ ス 非結球レタス ト マ ト ミニトマト な す	ネキリムシ類	6 kg	は種時 又は 植付時	2 回以内	土壌表面散布 土壌混和处理	2 回以内	
き ゆ う り				1 回			
ほうれんそう							
な ば な 類 (オータムポ エムを除く)	タネバエ	4 ～ 6 kg	は種時		播溝土壌混和	1 回	
オータムポエム	ヨトウムシ類	6 kg		土壌表面散布 土壌混和处理			
	ネキリムシ類			土壌表面散布			
だ い ず	タネバエ	4 ～ 6 kg	定植時	2 回以内	作条施用 土壌混和	2 回以内	
	ネキリムシ類		は種時又は 定植時		土壌表面散布		
			4 kg				は種時～ 本葉 2 葉期
	え だ ま め	タネバエ ネキリムシ類	4 ～ 6 kg		は種時		1 回
ネキリムシ類		定植時		土壌表面 散布			
			4 kg	は種時～ 本葉 2 葉期			
豆 類 (種実、但し、 だいずを除く)	タネバエ ネキリムシ類	4 ～ 6 kg	は種時	作条施用 土壌混和	1 回		
	さやえんどう	9 kg					
	実 え ん ど う	コガネムシ類幼虫				6 kg	
	さやいんげん	タネバエ				9 kg	
い ち ご (仮 植 床)	コガネムシ類幼虫	9 kg	植付時	土壌表面散布 土壌混和处理			
う ど	センノカミキリ	6 kg	成虫飛来 初期～盛期	5 回以内	散布	5 回以内	
ほ う き ぎ	ネキリムシ類	6 ～ 9 kg	定植時	1 回	株元散布	1 回	
た ば こ			植付前		土壌表面散布 土壌混和处理	2 回以内	