

ジクロロプロロップ液剤 ストッポール液剤	取扱メーカー： 日産、バイエル 原体メーカー： バイエル
成分： ジクロロプロロップ〔オーキシシン剤〕……………4.5%	性状： 淡黄褐色澄明水溶性液体 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 植物ホルモン剤であり、りんご、なしの収穫前落果を防止する作用に優れる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 所要量を所定量の水にうすめ、よくかきまぜてから散布する。
- 調製した薬液は、その日のうちに使用する。
- 使用の際は、薬液が葉先からしたたり落ちない程度に樹全体にムラなく丁寧に散布する。
- 効果が安定するまでに5～7日かかるので、散布適期を失しないように散布する。
- りんごに使用する場合、1回散布（収穫開始予定25日前）で落果防止効果があるが、より安定した効果を発現させる必要がある場合には2回目を10日程度間隔をあけた後、収穫開始予定7日前までに散布する。
- 早生品種は、収穫時期が高温であり、熟期促進作用が見られることがあるので、収穫遅れにならないよう注意し、収穫後の管理（低温貯蔵等）を十分行う。
- 散布により軟化が起る場合があるので、後期落果の少ない品種には使用しない。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 植物ホルモン剤なので特に使用時期、使用量、使用方法など誤らないよう果樹関係指導者の指導を受ける。
- りんごに使用する場合は、下記以外の品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬効、薬害を十分確認してから使用する。〔つがる、きおう、デリシャス系、紅玉、千秋、王林、北斗、ジョナゴールド、きたろう、さんたろう、未希ライフ〕
- なしに使用する場合は樹勢の弱い樹（特に長十郎）では薬害（早期落葉）の生じるおそれがあるので使用をさける。
- 無袋栽培の二十世紀、おさゴールド、ゴールド二十世紀、おさ二十世紀では、果実に薬害が生じるおそれがあるので使用をさける。
- 散布後に雨が降っても再散布しない。
- 他剤との混用、展着剤の加用はさける。
- 微量でホルモン作用をあらわすので他の作物（やまのいもなどの根部を収穫するものを含む）に隣接した場所では使用しない。また、使用後の散布器具などは十分洗浄する。

【安全対策上の注意】……………

- 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合は直ちに水洗する。
- 散布の際はマスク、手袋などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。

【適用と使用法】

作物名	使用目的	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期	使用方法	本剤及びジクロル プロップを含む農 薬の総使用回数
りんご	収穫前 落果防止	1000～1500倍	300～600ℓ	収穫開始予定日の25日 ～7日前（但し、2回 散布の場合は10日程度 間隔をあける）	立木全面 散布	2回以内
なし（赤なし、 但し、 王秋を除く）		2000～3000倍	200～300ℓ	収穫開始予定日の 14～7日前		1回
なし（青なし）		1500～2000倍				
なし（王秋）		2000～3000倍		収穫開始予定日の 30～7日前		