

銅水和剤 クミガード SC	取扱メーカー： クミカ 原体メーカー： —
成分： 水酸化第二銅……………20.0%	性状： 淡青緑色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】……………

- 葉液調製などの取り扱いが容易な液状の水酸化第二銅剤。
- ばれいしょ、てんさい等の作物病害に予防的散布で効果を示す。
- 優れた製剤技術により安定した防除効果を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 長期間貯蔵しておくとき分離するので、使用の際は容器をよく振って均一な状態に戻してから定量を取り出す。希釈する場合は、所定量の水に加えてから十分攪拌する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- かんきつに使用する場合は以下の事項に注意する。
 - 発芽期以降は薬害（スターメラノーズ）を生

じるおそれがあるので、炭酸カルシウム水和剤を加用する。特に果実の着生時期の散布では厳守する。

○樹勢の弱い木への散布や異常気温の予想される場合の散布はさける。

- 共通注意事項8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- 使用残りの葉液が生じないように調製し、使い切る。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。



【適用と使用法】……………

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	銅を含む農薬 の総使用回数
かんきつ	かいよう病	500～ 1000倍	200～ 700ℓ	—	—	散布	—
ばれいしょ	疫病 軟腐病	500倍	100～ 300ℓ				
てんさい	褐斑病		200～ 400ℓ				
茶	炭疽病 もち病			摘採前日まで			