

ヘキシチアゾクス水和剤 ニッソラン水和剤	取扱メーカー： 日本曹達 原体メーカー： 日本曹達
成分： ヘキシチアゾクス〔PRTR・1種〕……………10.0%	性状： 類白色水和性粉末45 μ m以下 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 各種ハダニ類に対し、低濃度で優れた効果がある。
- 残効性に優れ、長期間に渡ってハダニ類の発生を抑える。
- 殺成虫力はないが、薬剤処理された成虫からの産化卵をふ化させない作用がある。
- 他剤に抵抗性となったハダニにも安定した効果がある。
- ボルドー液などのアルカリ性剤との混用も可能である。
- 各種作物に葉害の心配がない薬剤である。
- 有益昆虫・天敵類に悪影響がない。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 殺成虫力がないため、効果が現われるまでに約10日間を要するので、誤ってまき直しなどをしていない。
- ハダニ類の発生初期に散布する。
- ハダニは繁殖が早いので、かけ残しのないように、丁寧に散布する。
- 本剤の連用散布は、ハダニ類の抵抗性を発達させるおそれがあるので、年1回の使用とし、作用性の異なる他の薬剤と輪番で使用する。（カーラとは類似した薬剤である。）

【薬効・薬害等の注意】……………

- 殺成虫力がないため遅効性であり、ハダニが高密度になってからの散布では手遅れになる場合があるので、発生初期の散布を厳守する。

【適用と使用方法】

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤及びヘキシチアソクス を含む農薬の総使用回数	使用 方法
かんきつ	ミカンハダニ	2000 ～ 4000 倍	200 ～ 700 ℓ	7 日前まで	2 回以内	散布
りんご	リンゴハダニ ナミハダニ	2000 ～ 3000 倍			1 回	
なぶどう	3000 倍					
もも				前日まで		
おうとうき					100 ～ 300 ℓ	
うめ	14 日前まで					
びわ		7 日前まで				
いちじく			2000 ～ 3000 倍			
いちご	2000 倍					
なきゅうり		2000 ～ 3000 倍				
にがうり			200 ～ 700 ℓ			
ピーマン	14 日前まで					
さやえんどう		7 日前まで				
実えんどう			2 回以内			
さやいんげん	2000 倍					
かぼちゃ		2000 ～ 3000 倍				
すいか			200 ～ 700 ℓ			
あずき	14 日前まで					
だいず		7 日前まで				
てんさい			2 回以内			
ホップ	14 日前まで					
しそ		21 日前まで				
しそ (花穂)			14 日前まで			
食用ぎく	前日まで					
未成熟ふじまめ		21 日前まで				
未成熟ささげ			60 日前まで			
ししとう	7 日前まで					
えだまめ		3 日前まで				
さんしょう(葉)			—			
かんしょ	2 回以内					
メロン		2 回以内				
花き類・ 観葉植物			2 回以内			