

グリセリン酢酸脂肪酸エステル ベミデタッチ	取扱メーカー： 石原、北興 原体メーカー： 石原
成分： アセチルグリセリン＝脂肪酸エステル……………80.0%	性状： 淡黄色澄明可乳化油状液体 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第4石油類・危険等級Ⅲ

【品目特性】 ……………

- コナジラミ類成虫の飛来，吸汁，交尾を阻害する行動制御剤。コナジラミの種にかかわらず効果を示し，また既存剤への感受性低下を起こしたコナジラミにも有効。
- コナジラミ類による植物ウイルスの媒介も抑制する。ウイルス感染の危険性が高い定植初期からの利用で，難防除であるウイルス病の蔓延を予防する。
- 有効成分は植物由来の食品添加物であるため使用回数に制限がない。また，有用生物への影響も少ないため作期を通して安全に使用でき，IPM体系にも適している。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】 ……………

- トマトの生育初期～コナジラミ飛込み終了時期に使用する。
- 7日間隔で上記の期間，連続散布（8～12回程度）する。
- 施設栽培で飛込みを防ぐため，必ず防虫ネット（0.4mm 以下）を展張する。

【薬効・薬害等の注意】 ……………

- 本剤はコナジラミの成虫に対する忌避効果が主体の剤であり，他のステージに対する効果はないか劣るので，成虫の飛来前や発生初期に使用する。
- 適用作物（トマト，ミニトマト）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】 ……………

- 桑葉にかからないよう注意（蚕毒）。

【適用と使用法】 ……………

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	グリセリン酢酸脂肪酸エステルを含む農薬の総使用回数
トマト ミニトマト	コナジラミ類	500 倍	100 ～ 300 ℓ	前日まで	－	散布	－