

アセフェート水溶剤 ジェイエース水溶剤	取扱メーカー： 全農 原体メーカー： 興農
成分： アセフェート〔有機リン系 PRTR・1種〕……………50.0%	性状： 淡青色水溶性粉末 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 有機リン系殺虫剤で、昆虫の神経系のアセチルコリンエステラーゼの活性を阻害し、アセチルコリンを分解できなくするため異常興奮を起こし、やがて死亡する。
- 殺虫スペクトラムが広く、広範囲の食葉性・吸汁性害虫に速効的に高い効果を示す。
- 水溶剤のため、散布液により葉や果実が汚れにくい。
- 散布後、速やかに有効成分が植物体に吸収されるため、降雨などによる効果の低下が少ない。
- 有効成分が速やかに吸収、浸透し、長期間殺虫効果を発揮する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 2週間以上の残効が期待できるが、害虫の発生量・種類などによって散布間隔を調節する。
- アブラムシ類やコナガなどに有機リン剤抵抗性の発達している地域では、作用性の異なる薬剤と組み合わせて使用する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 散布液調整後は速やかに使用する。
- てんさい及びばれいしょに対して希釈倍数300倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の地上液剤散布装置を使用する。
- さくらに対しては夏期高温時の使用はさける(薬害)。
- てんさいの育苗期の灌注は、葉液が茎葉に残らないように軽く散水(1㎡当り0.5ℓ)して除去する(薬害)。
- 共通注意事項8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】……………

- ミツバチやアブラバチなどの有用昆虫を放飼している場合は使用をさける。
- 蚕に影響があるので、桑葉にかからないように注意する。
- 眼に対して刺激性を有するので、眼に入らないよう注意する。眼に入った場合は直ちに洗眼し、眼科医の手当を受ける。
- 共通注意事項6. 街路・公園・堤とう等で使用する場合は注意事項を参照。



【適用と使用法】

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用流量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	アセフェートを含む 農薬の総使用回数	
かき	カキクダアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノヘタムシガ	1500倍	200～ 700 ℓ	45日前まで	2回以内	散布	2回以内	
いちじく	アザミウマ類	2000倍						1回
キャベツ	ハスモンヨトウ アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類 タマナギンウワバ	1000～ 1500倍	100～ 300 ℓ	30日前まで	1回		2回以内 (定植時までの 処理は1回 以内、定植 後の散布は 1回以内)	
	はくさい	ハスモンヨトウ アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類			1500倍			1回
		レタス 非結球レタス			ヨトウムシ ハスモンヨトウ		1000～ 1500倍	3回以内
オオタバコガ					1000倍			
カリフラワー	ヨトウムシ	1000倍		14日前まで				
チンゲンサイ みずな	アブラムシ類	1500倍		21日前まで				
オクラ	アブラムシ類 フタテンミドリヒメヨコバイ	1000倍		収穫開始 7日前まで	1回		1回	
	ほうれんそう			アブラムシ類	30日前まで			
にんにく	ネギコガ アブラムシ類			1000倍	7日前まで	2回以内	2回以内	
やまのいも	ジャガイモヒゲナガアブラムシ ヨトウムシ オオニジュウヤホシテントウ				45日前まで	1回	1回	
ばれいしょ	アブラムシ類	1000～ 2000倍 300倍	25 ℓ		30日前まで	2回以内	3回以内 (植付時の処 理は1回以 内、植付後 は2回以内)	
	たまねぎ	ネギアザミウマ		1000～ 1500倍		100～ 300 ℓ	21日前まで	5回以内
てんさい	ヨトウムシ	300倍	25 ℓ	45日前まで	3回以内	1回	4回以内 (育苗期の灌 注は1回以 内、散布は 3回以内)	
	テンサイモグリハナバエ	1000倍	100～ 300 ℓ					
	テンサイトビハムシ	60～ 100倍	ペーパー ポット1冊 当り1 ℓ (3 ℓ/m ²)	育苗期	灌注			
	茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノコカクモンハマキ	1000～ 2000倍 1000～ 1500倍	200～ 400 ℓ	摘採45日前 まで			散布

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	アセフェートを含む 農薬の総使用回数					
だ い ず	アブラムシ類 ハスモンヨトウ	1000 倍	100～ 300 ℓ	60 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内					
ご ぼ う	アブラムシ類			45 日前まで	1 回		2 回以内 (株元散布は 1 回以内、 散布は 1 回 以内)					
あ ず き	アブラムシ類 ノメイガ類			14 日前まで	3 回以内		3 回以内					
いんげんまめ	アブラムシ類			発生初期	5 回以内		5 回以内					
花き類・観葉植物 (ばら、きくを除く)	アブラムシ類 アザミウマ類							200～ 700 ℓ				
つばき 類	チャドクガ	1500 倍										
つつじ 類	ツツジグンバイ	1500～ 2000 倍										
さ く ら	アメリカシロヒトリ	1000～ 1500 倍										
	モンクロシャチホコ	1500 倍	100～ 300 ℓ									
ば ら	アブラムシ類	1000 倍										
	アザミウマ類	1000 倍										
き く	アブラムシ類 アザミウマ類	1000～ 1500 倍										
	マメハモグリバエ オオタバコガ	1000 倍										
	た ば こ	ヨトウムシ タバコアオムシ アブラムシ類	1500～ 2500 倍	25～ 180 ℓ	10 日前まで		2 回以内	2 回以内				
芝	スジキリヨトウ シバツトガ	1000 倍	0.3 ℓ / m ²	発生初期	5 回以内		5 回以内					
	タマナヤガ		0.3～0.5 ℓ /m ²									
	シバオサゾウムシ成虫		0.3～1 ℓ /m ²									