

シメトリン・ピリミスルファン・フェンキノトリオン粒剤 ツイゲキ1キロ粒剤	取扱メーカー： クミカ 原体メーカー： 日本化薬、クミカ、クミカ
成分： シメトリン〔トリアジン系 PRTR・1種〕……………3.0% ピリミスルファン〔スルホンアニリド系〕……………0.75% フェンキノトリオン……………2.5%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】……………

●後発生や取りこぼした雑草を防除できる中・後期除草剤。

●ノビエ、一年生雑草、多年生広葉雑草の幅広い草種に効果がある。

●難防除多年生雑草（オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ）にも高い効果を示す。

●草丈20cmまでのホタルイや矢じり葉4葉期までのオモダカ、草丈30cmまでのクログワイなど、大きくなった雑草にも有効。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

●共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。

●雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの4葉期までに、時期を失ないように散布する。

●多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布する。

雑草名	散布適期
ホタルイ	草丈20cmまで
ミズガヤツリ ウリカワ	5葉期まで
ヘラオモダカ	ヘラ葉1葉期まで
ヒルムシロ	発生盛期まで
セリ	増殖期まで
オモダカ	矢尻葉4葉期まで
クログワイ コウキヤガラ シズイ	草丈30cmまで
アオミドロ・藻類による表層はく離	発生初期まで

●オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイに有効な前処理剤との組み合わせで使用することで、より高い効果が得られる。

【薬効・薬害等の注意】……………

●共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。

●適用作物（水稲）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

●適用外作物（いぐさ、れんこん、せり、くわい）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

●直播水稲に使用する場合は以下の点に注意する。

○発芽前の稲に対して薬害を生じるおそれがあるので、適切な覆土を行い、稲の5葉期以降に散布する。

○稲の根が露出した条件では薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。

○除草効果の低下と生育抑制の薬害が発生するおそれがあるので、入水後水持ちの安定した後散布する。

【安全対策上の注意】……………

●眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。

●散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換する。

●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。

●藻類に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。

●散布後は水管理に注意する。

- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。
- 空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

- カブレやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

【適用と使用法】

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 多年生広葉雑草 アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植後 20 日 (稲 5 葉期以降) ～ノビエ 4 葉期 但し、 収穫 75 日前まで	1kg	湛水散布	1 回 ※
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ	稲 5 葉期～ ノビエ 4 葉期 但し、 収穫 75 日前まで			

※シメトリンを含む農薬の総使用回数 ：2回以内
 ※ピリミスルファンを含む農薬の総使用回数 ：2回以内
 ※フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内