

<b>イミベンコナゾール乳剤</b> <b>マネージ乳剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> 北興  <b>原体メーカー：</b> 北興
<b>成分：</b> イミベンコナゾール〔エルゴステロール生合成阻害剤〕…5.0% <b>その他 PRTR 該当成分：</b> ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル (PRTR・1 種)…2.7%	<b>性状：</b> 淡黄色澄明可乳化油状液体  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級Ⅲ

### 【品目特性】 .....

- 花き、花木、芝の各種うどんこ病、さび病に対し、低濃度で高い効果を示す。
- 乳剤なので作物の汚れが少なく、薬液の調製も容易である。
- マネージDFの項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】 .....

- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調整する。

### 【薬効・薬害等の注意】 .....

- 共通注意事項8、適用作物群に関する注意事項を参照。

### 【安全対策上の注意】 .....

- 自動車などにかからないように注意(塗装汚染)。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- 共通注意事項6、街路・公園・堤とう等で使用する場合の注意事項を参照。



【適用と使用方法】 .....

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤及びイミベンコナゾールを含む農薬の総使用回数	使用方法	
芝 (日本芝)	さび病	1000 ～ 1500倍	0.2 ℓ /m <sup>2</sup>	発病初期	6 回以内	散布	
	ヘルミントスポリウム葉枯病 カーブラリア葉枯病	1000倍					
芝 (ペントグラス)	ダラースポット病	500倍	0.2～ 0.5 ℓ /m <sup>2</sup>				
		1000倍	1 ℓ /m <sup>2</sup>				
ば            ら	黒星病	500 ～ 1000倍	0.2～ 0.3 ℓ /m <sup>2</sup>				
	うどんこ病						
き            く	白さび病						
	黒さび病						
コ   ス   モ   ス	白斑病	1000倍	0.2～ 0.7 ℓ /m <sup>2</sup>				
樹   木   類 (まさき,さるすべり, じんちょうげ,ポプラ, ぼけ, やなぎ, せいようきんしばい を除く)	うどんこ病						
ま   さ   き さ   る   す   べ   り							500 ～ 1000倍
じ   ん   ち   ょ   う   げ	黒点病 うどんこ病						1000倍
ポ   プ   ラ	マルゾニナ落葉病 うどんこ病						
ぼ            け	褐斑病 赤星病 うどんこ病						
	葉さび病 うどんこ病						
や            な            ぎ	さび病 うどんこ病						
せいようきんしばい	うどんこ病						