

<b>シハロトリン乳剤</b> <b>サイハロン乳剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> シンジェンタ  <b>原体メーカー：</b> シンジェンタ
<b>成分：</b> シハロトリン〔ピレスロイド系〕……………5.0% <b>その他 PRTR 該当成分：</b> キシレン〔PRTR・1種〕……………43% エチルベンゼン〔PRTR・1種〕……………41% ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル〔PRTR・1種〕…2%	<b>性状：</b> 淡黄色澄明液体  <b>毒性：</b> 劇物 <b>消防法：</b> 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級III

### 【品目特性】……………

●アオムシ、ヨトウムシなどのチョウ目害虫を始め、アブラムシやネギアザミウマにも有効で主要害虫の同時防除ができる。

●果菜類には果実に対する汚れも少なく、収穫前日でも使用できるので、収穫期間中でも害虫防除ができる。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

●本剤をばれいしょに対して希釈倍数1000倍で散布する場合及び、てんさいに対して希釈倍数750倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の地上液剤散布装置を使用する。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

●共通注意事項8、適用作物群に関する注意事項を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

●共通注意事項7、ミツバチに対する注意事項を参照。

●魚類に強い影響を及ぼすおそれがあるので特に注意。

●散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。

●本剤はのど、鼻、皮膚などを刺激する場合、また、カユミを生じる場合があるので注意する。



【適用と使用法】 .....

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	シハロトリンを含む 農業の総使用回数
ばれいしょ	アブラムシ類	3000～ 4000倍	100～ 300 ℓ	前日まで	4 回以内	散布	4 回以内
		1000倍	25 ℓ				
きゅうり	オンシツコナジラミ	2000～ 4000倍	100～ 300 ℓ		3 回以内		3 回以内
すいか メロン	アブラムシ類	3000～ 4000倍			1 回		1 回
なす	オンシツコナジラミ アブラムシ類	2000～ 4000倍			3 回以内		3 回以内
キャベツ	アオムシ	2000倍		7 日前まで			
はくさい	コナガ			14 日前まで			
だいこん	アブラムシ類 ヨトウムシ			21 日前まで			
てんさい	ヨトウムシ	2000～ 3000倍	750倍	7 日前まで	4 回以内	4 回以内	
	たまねぎ	カメノコハムシ	3000倍	100～ 300 ℓ	3 日前まで	3 回以内	3 回以内
小麦	ネギアザミウマ	60～ 150 ℓ					
豆類 (種実、但し、 らっかせいを除く)	アブラムシ類	4000倍	100～ 300 ℓ	3 日前まで			
花き類・観葉植物 (きくを除く)	オオタバコガ			—			
きく	アブラムシ類 オオタバコガ						