

シハロトリン水和剤 サイハロン水和剤	取扱メーカー： シンジェンタ，日農 原体メーカー： シンジェンタ
成分： シハロトリン〔ピレスロイド系〕……………5.0%	性状： 類白色水和性粉末 毒性： 劇物 消防法： ——

【品目特性】……………

- りんご，なし，ももなどの果樹を始め，あぶらな科野菜や果菜，ばれいしょ，茶，たばこなど各種の作物に広範に使用できる。
- シンクイムシ，ハマキムシ，アオムシ，ヨトウムシなどのチョウ目害虫に有効であるほか，アブラムシ，コナジラミ及びアザミウマにも有効。
- 各種害虫に対し速効的に作用するとともに残効性にも優れる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 茶，みかんでの散布は，ハダニが増加することがあるので注意する。
- 共通注意事項8，適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 共通注意事項7，ミツバチに対する注意事項を参照。
- 摘果等の作業の際は農業用マスク，手袋，長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。
- 眼に対して刺激性がある。
- 魚類に強い影響を及ぼすおそれがあるので特に注意。
- 甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので，使用時は注意。
- のど，鼻，皮膚などを刺激する場合，また，カユミを生じる場合があるので注意する。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	シハロトリンを含む 農薬の総使用回数
りんご	シンクイムシ類 ハマキムシ類 ギンモンハモグリガ モモチョッキリゾウムシ	2000 倍	200 ～ 700 ℓ	7 日前まで	3 回 以内	散布	3 回以内
	キンモンホソガ アブラムシ類	2000 ～ 3000 倍					
なし	シンクイムシ類 ハマキムシ類 ナシチビガ カメムシ類	2000 倍					
	アブラムシ類	2000 ～ 3000 倍					

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	シハロトリンを含む 農薬の総使用回数
もも	シンクイムシ類 モモハモグリガ	2000 倍	200 ～ 700 ℓ	7 日前まで	3 回 以内	散布	3 回以内
	アブラムシ類	2000 ～ 3000 倍					
みかん	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ アブラムシ類 カメムシ類	2000 倍		21 日前まで			
キャベツ	アオムシ コナガ アブラムシ類	2000 ～ 3000 倍	100 ～ 300 ℓ	7 日前まで			
はくさい	ヨトウムシ タマナギンウワバ			14 日前まで			
				21 日前まで			
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ			14 日前まで			
レタス	アブラムシ類			前日まで			
きゅうり	オンシツコナジラミ						
なす	アブラムシ類	2000 倍	4 回 以内	4 回以内			
ばれいしょ	テントウムシダマシ類 アブラムシ類	2000 ～ 4000 倍					
てんさい	ヨトウムシ		7 日前まで				
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャノキイロアザミウマ コミカンアブラムシ チャノミドリヒメヨコバイ ヨモギエダシヤク チャハマキ	2000 倍	200 ～ 400 ℓ	摘採 7 日前まで	1 回	1 回	
たばこ	タバコガ ヨトウムシ	2000 ～ 3000 倍	25 ～ 180 ℓ	10 日前まで	2 回 以内	2 回以内	
芝※	シバツトガ スジキリヨトウ		300ml/m ²	発生初期	3 回 以内	3 回以内	

※：同一薬剤名（会社名を除き）であっても登録内容が異なる箇所。使用時には必ずラベルで登録内容を確認すること。