

MEP粉剤 スミチオン粉剤 3 DL	取扱メーカー： 協友アグリ, サンケイ*, 日農, 北興, 住友化学, 琉産 原体メーカー： 住友化学
成分： MEP〔有機リン系 PRTR・1種〕……………3.0%	性状： 類白色粉末45 μ m以下, 浮遊性指数20以下 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 人畜毒性が低く（普通物）、害虫には接触的、食毒的に作用する。
- 浸透性があり、食入した害虫にも有効であり、また殺卵力も有する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- ニカメイチュウの防除適期は「ふ化の中期～後期」で、ふ化初期の散布では効力が十分に発揮出来ない。なお、発生が長時間に渡ってダラダラとつづく場合には2回散布がより確実である。
- 稲を加害するカメムシ類は、周辺の雑草や畑作物などに生息していて、稲の出穂期以降に稲穂に集まり、短期間に吸汁加害して斑点米をつくる。従って広域に一斉防除する方がより安定した効果がある。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 適用外作物（あぶらな科作物）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に薬剤がかからないよう注意。
- 桑葉にかからないよう注意（蚕毒）。
- 共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を参照。
- 魚類、甲殻類に影響を及ぼすので、使用時並びに使用後も注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



【適用と使用法】……………

作物名	適用場所	適用害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	MEPを含む農 薬の総使用回数
稲	—	ニカメイチュウ ウンカ類 コブノメイガ カメムシ類 イネドロオイムシ アザミウマ類	3～4 kg	21 日前まで	2 回以内 (但し、出穂 前は1回)	散布	3 回以内 (種もみへの処 理は1回以内、 育苗箱散布は1 回以内、本田 では2回以内)
だ い ず		アワヨトウ カメムシ類	4 kg				
水田作物 畑作物 (休耕田)	ヨシ、オギ、ス スキ、セイタカ アワダチソウ 等の多年生雑 草が優占して いる休耕田	カメムシ類	3～4 kg	—	4 回以内	散布	4 回以内
さとうきび※	—	カンショコバネナガカメムシ		45 日前まで			

※：同一薬剤名（会社名を除き）であっても登録内容が異なる箇所。使用時には必ずラベルで登録内容を確認すること。