

<b>イマズスルフロン・オキサジクロメホン・ダイムロン水和剤</b> <b>サラブレッドフロアブル</b>	<b>取扱メーカー：</b> サンケイ* <b>原体メーカー：</b> 住友化学，全農， エス・ディー・エス
<b>成分：</b> イマズスルフロン〔スルホニルウレア系〕……………1.7% オキサジクロメホン〔オキサジノン系 PRTR・1 種〕…1.2% ダイムロン〔尿素系〕……………18.0%	<b>性状：</b> 類白色水和性粘稠懸濁液体 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

●水稲移植後の水田に，原液のまま直接散布できるフロアブル剤であり，畦畔からの手振り散布や水口施用及び田植同時散布など省力的な散布ができる初・中期一発処理除草剤である。

●残効期間が50～60日程度と極めて長く，早期散布（例えば移植直後）を行っても，1回の散布で十分な除草効果が得られる。

●3つの成分を合理的に配合した製剤である。

●水田一年生雑草から多年生雑草まで高い効果を示す。また，難防除雑草であるクログワイ，オモダカ，シズイやアオミドロ，表層はく離に対しても効果が期待できる。

●水稲に対する安全性が高いため移植直後から散布でき，ノビエの2.5葉期まで幅広い散布適期幅がある。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

●共通注意事項の5，水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。

雑草名	散布適期
ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	2 葉期まで
オモダカ クログワイ	発生始期まで
ヒルムシロ	発生期まで
セリ	再生始期まで
シズイ	草丈3cmまで
アオミドロ・藻類による表層はく離	発生前

### 【薬効・薬害等の注意】……………

●共通注意事項の5，水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。

●適用作物（水稲）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

●適用外作物（いぐさ，れんこん，せり，くわい）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。これら作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意する。

●いぐさ栽培予定田では使用しない。

【適用と使用方法】 .....

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ ヒルムシロ セリ クログワイ シズイ アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植時	500 ml	田植同時散布機で施用	1 回※
		移植直後～ ノビエ2.5葉期 但し、 移植後30日まで		原液湛水散布又は水口施用	

※イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数 : 2 回以内

※オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数 : 2 回以内

※ダイムロンを含む農薬の総使用回数 : 3 回以内 (育苗箱散布は 1 回以内, 本田では 2 回以内)