## 

## 

- ●ハスモンヨトウなどのチョウ目害虫に高い効果を示すマトリックにカメムシ防除剤として定評のあるMR. ジョーカーを配合した混合粉剤で、稲、だいずの主要害虫を的確に防除する。
- ●MR. ジョーカーのカメムシ類に対する残効は 長く,ウンカ類,ツマグロヨコバイ,コブノメイ ガにも有効。
- ●マトリックはチョウ目幼虫に特異的に作用し、 処理後、致死までにはやや時間がかかるが、食害 は速やかに停止するので被害が少ない。
- ●作用性についてはマトリックフロアブル、MR. ジョーカー剤の項参照。
- ●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一 覧表」を参照。

## 

- ●蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が 飛散し、桑に付着するおそれのある場所では使用 しない。
- ●共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を 参照。
- ●眼に対して弱い刺激性があるので、眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- ●散布の際は農薬用マスクなどを着用する。作業 後はうがいをする。
- ●カブレやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- ●甲殻類に影響を及ぼすので,使用時並びに使用 後も注意。









## 【適用と使用法】……

	作物名	適用害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法		シラフルオフェンを含 む農薬の総使用回数
	稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 コブノメイガ フタオビコヤガ	4 kg 3 ~ 4 kg	14日前 まで	2回 以内	散布	2回以内	2回以内
ŀ	だいず		3 ~ 4 Kg					
	えだまめ	カメムシ類 ハスモンヨトウ	4 kg	7日前まで	3回 以内		3回以内	3回以内