

アジムスルフロン・ピリフタリド・メソトリオン粒剤 オシオキMX 1キロ粒剤	取扱メーカー： 三井アグロ 原体メーカー： FMC, シンジェンタ, シンジェンタ
成分： アジムスルフロン〔スルホニルウレア系〕………0.18% ピリフタリド………1.8% メソトリオン〔トリケトン系〕………1.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】 ……………

- 3.5葉期から4葉期までのノビエを始めとする一年生雑草や主要な多年生雑草に効果を示す。
- メソトリオンを含有し、スルホニルウレア抵抗性を獲得した雑草に対しても効果を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】 ……………

- 前処理剤との体系で使用し、雑草の発生状況をよく確認し、時期を失ないように散布する。
- 散布後少なくとも3～4日間は通常の湛水状態(水深3～5cm)を保つ。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布するように注意する。

雑草名	散布適期
ホタルイ	草丈10cm以下
ヘラオモダカ ウリカワ ミズガヤツリ	4葉期まで
ヒルムシロ	生育期まで(直播水稲は発生期まで)
セリ	再生前～生育期まで (直播水稲は再生期～再生始期まで)
クログワイ	生育期(草丈30cm以下)まで
オモダカ	生育期(矢じり葉3葉期)まで
コウキヤガラ シズイ	草丈30cm以下

●クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ、シズイは有効な前処理剤と組み合わせて使用する。また、クログワイ、オモダカに有効な前処理剤と組み合わせて連年施用することにより、さらに効果が向上する。

●共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。

【薬効・薬害等の注意】 ……………

- 補植は必ず散布前に行う。
- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用作物(水稲)の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物(いぐさ、れんこん、せり、くわい)への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。このような作物の隣接田で使用する場合は十分注意。

【安全対策上の注意】 ……………

- カブレやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- 無人ヘリコプター散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機(無人ヘリコプター等)による散布・滴下に関する注意事項を参照。



【適用と使用法】

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ コウキヤガラ シズイ	移植後14日～ ノビエ4葉期 但し、 収穫45日前まで	1kg	湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布	1回※
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲3葉期～ ノビエ3.5葉期 但し、 収穫45日前まで			

※アジムスルフロンを含む農薬の総使用回数：1回
 ※ピリフタリドを含む農薬の総使用回数：2回以内
 ※メソトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内