

カルタップ・ブプロフェジン粒剤 アプロードパダン粒剤	取扱メーカー： 日農，住友化学 原体メーカー： 住友化学，日農
成分： カルタップ塩酸塩〔ネライストキシン系 PRTR・1種〕…4.0％ ブプロフェジン〔IGR（脱皮阻害剤） PRTR・1種〕…2.0％	性状： 類白色細粒 毒性： 劇物 消防法： —

【品目特性】

●ウンカ、ヨコバイ類に特異な殺虫作用を示す「アプロード」とニカメイチュウ、コブノメイガなど食害性害虫に優れた効力を持つ「パダン」を混合した水面施用粒剤である。

●散布適期の幅が広い。

●手まきで簡単に散布できる。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

●使用に当っては，3 cm前後の湛水とし，田面に均一に散布し，散布後少なくとも4～5日間は湛水状態を保ち，散布後7日間は落水やかけ流しはしない。

●漏水の激しい水田では使用しない。

●浮き草や雑草が繁茂している水田では，効果の劣ることがあるので，あらかじめ除草をしてから散布する。

●ウンカ類の成虫に対しては直接作用しないので，幼虫主体の時期に散布するのが望ましい。またその場合，薬剤散布効果が発現するまでに3～7日を要するので下記のことに留意する。

○成虫防除を必要とする場合には，成虫に有効な薬剤と組み合わせて使用する。

○多発時の散布は直ちに密度を低下させることができないので速効性のある薬剤と組み合わせて使用する。

【安全対策上の注意】

●魚類に影響を及ぼすので，使用時は注意。

●甲殻類，ドジョウに影響を及ぼすので，使用時並びに使用後は注意。

●散布後は河川，養殖池等に流入しないよう，水管理に注意する。

●眼に対して刺激性がある。

●皮膚に対して弱い刺激性がある。



【適用と使用法】

作物名	適用害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	カルタップを含む 農薬の総使用回数	ブプロフェジンを含む 農薬の総使用回数
稲	ニカメイチュウ コブノメイガ ウンカ類幼虫 イネツトムシ	3～4 kg	30 日前 まで	4 回以内	湛水 散布	6 回以内 (浸種前は1回以 内，浸種後から直 播では種時又は 移植時までの処理 は1回以内)	4 回以内 (小包装投入は 1 回以内)