

シエノピラフェン・ピリダベン水和剤 スターマイトプラスフロアブル	取扱メーカー： 日産 原体メーカー： 日産，日産
成分： シエノピラフェン〔プロペンニトリル系〕……………15.0% ピリダベン〔PRTR・1種〕……………7.5%	性状： 淡褐色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 劇物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 既存の薬剤に抵抗性を発達させたハダニにも、サビダニにも優れた効果を示す。
- ハダニ、サビダニの卵～成虫、全てのステージに有効。
- 速効的に作用し、しかも実用上十分な残効を有する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 使用に際しては容器をよく振る。
- 植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の裏表に十分に散布する。
- ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布ムラのないように丁寧に散布する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 石灰硫黄合剤とは混用をさける。
- ボルドー液との混用及び14日以内の近接散布は効果が劣るのでさける。
- 共通注意事項8、適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 共通注意事項7、ミツバチに対する注意事項を参照。
- 魚類に強い影響を及ぼすおそれがあるので特に注意。
- 魚類、甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので、使用時は注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	シエノピラフェン を含む農薬の総使用回数	ピリダベンを含む 農薬の総使用回数
かんきつ	ミカンハダニ サビダニ類 チャノホコリダニ	1000 倍	200～ 700 ℓ	7日前まで	1 回	散布	2 回以内	2 回以内
茶	カンザワハダニ サビダニ類 チャノホコリダニ		200～ 400 ℓ	摘採14日 前まで			1 回	