

ダントツ EX フロアブル

成分：クロチアニジン〔ネオニコチノイド系〕……20.0%

毒性：普通物

【適用と使用法】

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数
稲	イナゴ類 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イネドロオイムシ	5000 倍	60～ 150 ℓ	7 日 前 まで	3 回 以 内	散布	4 回以内 (直播では 種時又は移植 時までの処理 は 1 回以内、 本田での散 布、空中散布、 無人航空機散 布は合計 3 回 以内)
	ウンカ類 カメムシ類	1250 倍	25 ℓ				
	ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ	90 倍	3 ℓ			空中散布	
	ウンカ類 カメムシ類（アカヒゲ ホソミドリカスミカメ を除く）	24 倍	800 ml				
	アカヒゲホソミドリカスミカメ	24～ 36 倍					
	イネドロオイムシ	36 倍					
	直 播 水 稲	イネミズゾウムシ	原液			種もみ 3kg 当り 75 ml	
イネドロオイムシ		種もみ 8～10kg 当り 75 ml					
だ い ず	アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ	2500～ 5000 倍	100～ 300 ℓ	7 日 前 まで	3 回 以 内	散布	4 回以内 (は種時の土 壌混和は 1 回 以内、散布は 3 回以内)
	マメシクイガ	2500 倍					
	アブラムシ類 カメムシ類	24 倍	800 ml			無人航空機 による散布	
ばれいしょ	アブラムシ類	5000 倍	100～ 300 ℓ			散布	4 回以内 (植付時の土 壌混和は 1 回 以内、植付後 は 3 回以内)

〔取扱メーカー〕 ホクサン、住友化学*