

銅・プロシミドン水和剤 スクレタン水和剤	取扱メーカー： 北興 原体メーカー： ——，住友化学
成分： 塩基性塩化銅〔銅〕……………67.3% （銅として……………40.0%） プロシミドン〔ジカルボキシイミド系〕……………20.0% その他 PRTR 該当成分： ドデシル硫酸ナトリウム〔PRTR・I 種〕……………1.8%	性状： 淡緑色水和性粉末 45 μ m 以下 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- スミレックス水和剤，ドイツボルドーAの項参照。
- 灰色かび病，菌核病に卓効なプロシミドンと予防効果の優れた銅を混合した薬剤で，予防と治療効果を発揮する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 発病前の予防的使用がより安定した防除効果を発揮する。
- 病気に感染しやすい部分に十分薬液がかかるように注意して薬剤散布を行う。
- 防除効果は，伝染源の焼却，ハウス内の換気，栽植密度などといった耕種の防除と組み合わせることにより，一段と高くなる。

【薬効・薬害等の注意】……………

- マシン油乳剤及びチオファネートメチル剤などの混用はさける。
- レタスに使用する場合は，炭酸カルシウム水和剤を加用する。なお，収穫間際の散布では収穫物に汚れを生じるおそれがあるので注意する。
- 過度の連用はさけ，作用性の異なる薬剤と組み合わせ輪番で使用する。
- 適用作物（全般及びみかん，レタス）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（あぶらな科作物，特に，はくさい，だいこん，ストック）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 魚類，甲殻類，藻類に影響を及ぼすおそれがあるので，使用時は注意。



【適用と使用法】

作物名	適用病害名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	銅を含む農薬 の総使用回数	フロジミドンを含む 農薬の総使用回数
きゅうり	灰色かび病 べと病 斑点細菌病 菌核病 炭疽病 うどんこ病	500倍	100～ 300 ℓ	前日まで	6回以内	散布	——	6回以内 (常温煙霧は 2回以内)
すいか	つる枯病 菌核病 炭疽病 褐斑細菌病			7日前まで	5回以内			5回以内
たまねぎ	灰色腐敗病 軟腐病 灰色かび病 りん片腐敗病			前日まで				
レタス	菌核病 灰色かび病 軟腐病 腐敗病			7日前まで				
ばれいしょ	菌核病 疫病 軟腐病			21日前まで	4回以内			4回以内
みかん	かいよう病 灰色かび病		200～ 700 ℓ	開花期 但し、収穫 30日前まで	3回以内			3回以内