

<b>ペノキスラム・ベンタゾン粒剤</b> <b>ワイドパワー粒剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> 北興  <b>原体メーカー：</b> ダウ，BASF
<b>成分：</b> ペノキスラム〔スルホンアミド系〕……………0.12% ベンタゾン〔ダイアジン系〕……………11.0%	<b>性状：</b> 類白色細粒 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> —

### 【品目特性】……………

- ワイドアタックSC，バサグラン粒剤（ナトリウム塩）の項参照。
- ノビエを含む一年生雑草から多年生雑草まで高い効果を示す。
- スルホニルウレア抵抗性雑草にも高い効果を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 本剤は雑草の発生前から発生初期に有効なので散布時期に注意する。
- 移植水稻ではノビエの5葉期までに、直播水稻ではノビエの4葉期までに散布する。
- オモダカ，クログワイ，シズイの防除は、必要に応じて有効な前処理剤と組み合わせて使用する。

雑草名	散布適期	
	移植水稻	直播水稻
ホタルイ	5葉期まで	4葉期まで
ヘラオモダカ		—
ミズガヤツリ		3葉期まで
ウリカワ	4葉期まで (関東・東山・東海、九州は5葉期まで)	2葉期まで
ヒルムシロ	生育期まで	発生期まで
オモダカ	矢じり葉抽出期まで	—
クログワイ シズイ	草丈20cm以下	
セリ	—	
		再生前～始期

- 本剤は水の移動に伴う移行性が大きく、一般に水深が浅いほど効果が安定する。

○できるだけ落水状態（足跡に水が残っている状態）にして水の出入りを止め、まきムラのないように均一に散布する。

○水を落とすことができないところでは、漏水のない水田に限り、できるだけ浅水状態（雑草が水面上にでる状態）にして、まきムラがないように均一に散布する。

○散布後2日間はそのままの状態を保ち、入水、落水、かけ流ししない。また、散布後7日間は降雨の有無にかかわらず落水、かけ流ししない。

○処理後2日以内に降雨があると効果が不十分になるおそれがあるので、晴天の持続する時の使用が望ましい。

- 共通注意事項の5. 水稻除草剤散布 使用上のポイントを参照。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 砂質土及び漏水の激しい水田では使用しない。
- 軟弱稲では薬害のおそれがあるので使用はさける。

●直播水稻で使用する場合、稲の根が露出する条件では、薬害を生じるおそれがあるので注意する。

●適用作物（水稻）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

●適用外作物（いぐさ、れんこん、せり、くわいなど）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

- 共通注意事項の5. 水稻除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。



【適用と使用法】 .....

作物名	適用雑草名	適用土壌	使用時期	10 a 当り 使用量	適用地帯	使用方法	本剤の 使用回数
移植 水稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ (東北) クログワイ (関東・東山・東 海を除く) オモダカ ヒルムシロ シズイ (東北, 関東・東山・東海)	砂壤土 ～埴土	移植後20日～ ノビエ5葉期 但し、収穫 60日前まで	3kg	全域（北海道を 除く）の普通期 及び早期栽培地 帯	落水散布 又はごく 浅く湛水 して散布	1回 ※
直播 水稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ		稲4葉期～ ノビエ4葉期 但し、収穫 60日前まで		全域		

※ベノキスラムを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ペンタゾンを含む農薬の総使用回数       ：2回以内