カスガマイシン粒剤 カスミン粒剤	取扱メーカー: 北興 原体メーカー: 北興
成分: カスガマイシンー塩酸塩〔抗生物質類〕2.3% (カスガマイシンとして2.0%)	性状:類白色細粒 毒性:普通物 消防法:——

- ●作用機作は蛋白合成阻害と考えられる。
- ●育苗期の細菌性病害に優れた効果を示す。
- ●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一 覧表」を参照。

【使用上のポイント】…………

●TPN粉剤と併用処理しても効果,薬害などに 実用上影響はない。

【薬効・薬害等の注意】 …………

●育苗培土に混和する場合は, 所定薬量の全量(1 箱当り30g)を覆土のみに混和すると薬害を生 じることがあるのでさける。

【適用と使用法】………

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	カスガマイシンを含む農薬の総使用回数
		育苗箱 * (使用土壌約 5 ℓ) 1箱当り 30 g	は種前	1 🗉	育苗培土に均 一に混和する。	4回以内 (種子浸漬は1 回以内,育苗 箱への処理は1 回以内,本田 では2回以内)
稲(箱育苗)	幼苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 褐条病 苗立枯細菌病	育苗箱* (使用土壌約5ℓ) 1箱当り15~20g 育苗箱* (覆土約1ℓ) 覆土1ℓ当り 15~20g	覆土前		育苗箱には種 した種もみの 上から均一に 散布する。 覆土に均一に 混和する。	

*育苗箱は30×60×3 cm