

<b>ピラジフルミド水和剤</b> <b>パレード15フロアブル</b>	<b>取扱メーカー：</b> クミカ、日農  <b>原体メーカー：</b> 日農
<b>成分：</b> ピラジフルミド〔コハク酸脱水素酵素阻害剤（SDHI）〕…15.0%	<b>性状：</b> 類白色水和性粘稠懸濁液体 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消除法：</b> ——

### 【品目特性】 .....

●新規有効成分ピラジフルミドを配合した果樹用SDHI殺菌剤であり、褐斑病、輪紋病、うどんこ病、灰色かび病、灰星病、そうか病といった幅広い病害に高い効果を発揮する。

●SDHI殺菌剤の中で唯一ピラジカルボキサミド骨格を持ち、病害への高い効果と、適用作物への高い安全性を実現している。

●天敵や有用昆虫、環境生物への影響が少なく、様々な場面で使い易い。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】 .....

●過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用する。

### 【薬効・薬害等の注意】 .....

●ぶどうの幼果期（あずき大）以降の散布は、果粉が溶脱するおそれがあるので使用をさける。

●共通注意事項8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

### 【安全対策上の注意】 .....

●カブレやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

【適用と使用法】 .....

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含 む農薬の総使用回数	
りんご	黒星病 斑点落葉病 輪紋病 すす点病 すす斑病 うどんこ病 褐斑病 灰色かび病 黒点病 モニリア病	2000～ 3000倍	200～ 700 ℓ	前日まで	2回以内	散布	2回以内	
	赤星病	2000倍						
おうとう	灰星病	2000～ 3000倍						
なし	黒星病 輪紋病 うどんこ病 赤星病							
	黒斑病							2000倍
	うどんこ病							2000～ 3000倍
もも ネクタリン	灰星病 黒星病							
	小粒核果類	すす斑病(うめ)						2000倍
ぶどう		黒星病 灰色かび病 灰星病(すもも)						2000～ 3000倍
	黒とう病 さび病 灰色かび病 褐斑病							
	うどんこ病 落葉病							
	灰色かび病 そうか病							