

フェントラザミド・プロモブチド・ベンスルフロンメチル剤 クサトリー DX (1キロ粒剤75/ジャンボ H)	取扱メーカー： 三井アグロ 原体メーカー： バイエル、住友化学、クミカ
成分： フェントラザミド〔テトラゾリノン系 PRTR・1種〕3.0% (粒剤), 7.5% (ジャンボ) プロモブチド〔酸アミド系〕9.0% (粒剤), 15.0% (ジャンボ) ベンスルフロンメチル〔スルホニルウレア系〕0.75% (粒剤), 1.87% (ジャンボ)	性状： 類白色細粒 (粒剤) 淡褐色粒状、水溶性パック入り 1パック40g(ジャンボ) 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】

〈共通〉

- ノビエを始めとする一年生雑草や主要な多年生雑草に優れた効果を発揮する。アオミドロ・藻類による表層はく離に対して発生防止効果がある。
 - スルホニルウレア系除草剤に抵抗性を獲得した雑草 (ホタルイ類, アゼナ類, コナギ等) に対して安定した効果が期待できる。
 - 3種の有効成分を配合したノビエ2.5葉期まで処理できる初中期一発型除草剤である。
 - 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。
- ### 〈ジャンボ〉
- 畦畔から10a当り10パックを投げ込むだけで処理は完了する。

【使用上のポイント】

〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 散布後少なくとも3～4日間は通常の湛水状態を保つ。
- 雑草の発生前から生育初期に有効なのでノビエの2.5葉期までに時期を失ないように散布する。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布する。

雑草名	散布適期	
	粒剤	ジャンボ
ホタルイ ミズガヤツリ	2葉期まで	
ウリカワ	2葉期まで (北海道) 発生始期まで (東北)	
オモダカ クログワイ	発生始期まで	
ヘラオモダカ	2葉期まで (北海道) 発生始期まで (東北)	
エゾノサヤカグサ	—	
ミズアオイ	—	
ヒルムシロ	発生前まで	
セリ	再生始期まで	
シズイ	草丈3cmまで	—
アオミドロ・藻類による表層はく離	発生前	

〈粒剤〉

- オモダカ、クログワイ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さない。必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用する。またオモダカ、クログワイに有効な後処理剤と組み合わせて連年施用することにより、さらに効果が向上する。

〈ジャンボ〉

- 畦畔から軽く下手投げで投げ込む。
- パックは破らずにそのまま投げ込む。
- 処理に当たっては、水深5～6cmの湛水状態で行う。

【薬効・薬害等の注意】

〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 補植は必ず散布前に行う。
- 適用作物 (水稲) の薬害などの注意は「薬害注

意事項解説」を参照。

●適用外作物（いぐさ、れんこん、せり、くわい）
への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

〈共通〉

- 藻類に影響を及ぼすので、使用時は注意。
- カブレやすい人は取扱いに十分注意。

〈ジャンボ〉

- 水溶性フィルム包装が破袋した場合は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 吸湿性があるので湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を強く閉じて保管する。また、フィルムが劣化するおそれがあるので下積にならないようにする。

【適用と使用法】……………

①クサトリー DX 1キロ粒剤75

作物名	適用雑草名	適用 土壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	適用地帯	本剤の 使用回数
移植 水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ（東北） ウリカワ クログワイ（東北） オモダカ ヒルムシロ セリ シズイ（東北） アオミドロ・藻類に よる表層はく離	砂壤土 ～埴土	移植時	1 kg	田植同時 散布機で 施用	北海道 東北	1 回 ※
			移植直後～ ノビエ2.5葉期 但し、 移植後30日まで		湛水散布		
直播 水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ウリカワ	埴土～ 埴土	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫90日前まで				

※フェントラザミドを含む農薬の総使用回数：1 回

※プロモプチドを含む農薬の総使用回数：2 回以内

※ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数：2 回以内

②クサトリー DX ジャンボ H

作物名	適用雑草名	適用 土壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	適用地帯	本剤の 使用回数
移植 水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ（東北） ウリカワ クログワイ（東北） オモダカ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類に よる表層はく離	砂壤土 ～埴土	移植後3日～ ノビエ2.5葉期 但し、 移植後30日まで	小包装 （パック） 10 個 （400g）	水田に小包装 （パック）のま ま投げ入れる。	北海道 東北	1 回 ※

※フェントラザミドを含む農薬の総使用回数：1 回

※プロモプチドを含む農薬の総使用回数：2 回以内

※ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数：2 回以内