

<b>フルピリミン・プロベナゾール粒剤</b> <b>Dr. オリゼリディア箱粒剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> 北興, Meiji  <b>原体メーカー：</b> Meiji, Meiji
<b>成分：</b> フルピリミン.....2.0% プロベナゾール.....24.0%	<b>性状：</b> 類白色細粒 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

**【適用と使用法】** .....

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 イネドロオイムシ イネミズゾウムシ	1kg/10a	は種時	は種同時施 葉機を用い て土中施用 する。	本剤 1回 フルピリミン 3回以内 (直播ではは種時又は移植時 までの処理は1回以内, 本田 では2回以内) プロベナゾール 2回以内 (移植時までの処理は1回以 内)
	いもち病 イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ		移植時	側条施用	
稲 (箱育苗)	いもち病 イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ イネヒメハモグリバエ イネカラバエ フタオビコヤガ イナゴ類	50g	移植3日前 ～移植当日	育苗箱の上 から均一に 散布する。	本剤 1回 フルピリミン 3回以内 (移植時までの処理は1回以 内, 本田では2回以内) プロベナゾール 2回以内 (移植時までの処理は1回以 内)

\* 育苗箱は30×60×3cm, 使用土壌約5ℓ