

<b>メタルデヒド水和剤</b> <b>マイキラー L</b>	<b>取扱メーカー：</b> サンケイ  <b>原体メーカー：</b> ロンザ
<b>成分：</b> メタルデヒド……………10.0%	<b>性状：</b> 白色水和性粘稠懸濁液体 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

- 多くの種類のナメクジ類，カタツムリ類に優れた効果を示す。
- 薬剤に触れると即効的に作用する。
- 本製剤は普通物に該当し，取扱いやすい。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 夜行性害虫なので夕方散布すると効果的である。
- 使用する前にビンを必ず振って内容物を均一にする。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 共通注意事項8，適用作物群に関する注意事項を参照。
- 夏季高温時の使用をさける。

### 【安全対策上の注意】……………

- 皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないように注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。



### 【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	メタルデヒドを含む 農薬の総使用回数	
か ん き つ	ナメクジ類 カタツムリ類	200 倍	200～ 700 ℓ	30 日前 まで	3 回以内	散布	6 回以内 (散布及び株元 散布は合計3回 以内)	
キ ャ ベ ツ レ タ ス		400 倍	100～ 300 ℓ	14 日前 まで			6 回以内 (散布及び株元 散布は合計3回 以内 (但し、株 元散布は2回 以内))	
非結球レタス							—	6 回以内 (散布は3回 以内)
花き類・観葉植物								6 回以内

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	本剤の 使用回数	使用 方法	メタルデヒドを含む 農薬の総使用回数
ナメクジ類， カタツムリ類 が加害する農 作物等	ほ場周辺雑草 地の生息地	ナメクジ類 カタツムリ類	200 ～ 400 倍	100 ～ 300 ℓ	6 回以内	作物にかから ないように土 壌表面に散布 する。	6 回以内