

<b>インダノファン・ピラクロニル・ベンゾビスクロロン剤 ライジンパワー (1キロ粒剤 / ジャンボ / フロアブル)</b>	<b>取扱メーカー：</b> 日農 <b>原体メーカー：</b> 日農、協友アグリ、 エス・ディー・エス
<b>成分：</b> インダノファン〔オキシラン系 PRTR・1種〕 ……………1.2% (粒剤), 2.4% (ジャンボ), 2.3% (フロアブル) ピラクロニル ……………1.5% (粒剤), 3.0% (ジャンボ), 2.9% (フロアブル) ベンゾビスクロロン〔ビスクロオクタン系〕 ……………3.0% (粒剤), 6.0% (ジャンボ), 5.7% (フロアブル)	<b>性状：</b> 類白色細粒 (粒剤) 類白色細粒, 水溶性パック入り, 1パック50g(ジャンボ) 類白色水和性粘稠懸濁液体(フロアブル) <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

## 【品目特性】…………… 〈共通〉

●ノビエへの効果に定評のある有効成分の混合により、ノビエに速効的で安定した除草効果を発揮する。

●ベンゾビスクロロンとピラクロニルの相乗効果によりスルホニルウレア抵抗性雑草に優れた効果を発揮する。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

## 【使用上のポイント】…………… 〈共通〉

●共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。

●雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに時期を失ないように散布する。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布するように注意する。

雑草名	散布適期		
	粒剤	ジャンボ	フロアブル
ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ	2葉期まで		
オモダカ クログワイ コウキヤガラ	発生始期まで		
ヒルムシロ	発生期まで		
シズイ	草丈3cm		
アオミドロ・ 藻類による表層 はく離	—	発生前	—
エゾノサヤヌカガサ	—		2葉期まで

●苗の植付が均一となるように代かきを丁寧に行う。未熟有機物を施用した場合は特に丁寧に行う。  
**〈粒剤・フロアブル〉**  
●クログワイ及びオモダカに使用するには、必要に応じて有効な前処理剤又は後処理剤との組み合わせで使用する。

## 【薬効・薬害等の注意】…………… 〈共通〉

●いぐさ栽培予定水田では使用しない。  
●共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。

●適用作物（稲）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

●適用外作物（いぐさ、れんこん、せり、くわい）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

**〈フロアブル・ジャンボ〉**

●強風時の散布はさける。

## 【安全対策上の注意】…………… 〈共通〉

●眼に対して弱い刺激性がある。

●藻類に影響を及ぼすので、使用時並びに使用後も注意。

●散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。

**〈粒剤〉**

●魚類に影響を及ぼすので使用時は注意。

**〈ジャンボ〉**

●水溶性フィルムが破袋した場合、眼に対して刺激性があり、皮膚に対して弱い刺激性がある。

**〈フロアブル〉**

●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。

〈粒剤・フロアブル〉



【適用と使用方法】.....

①ライジンパワー 1キロ粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 多年生広葉雑草	移植後3日～ ノビエ2.5葉期 但し、 移植後30日まで	1 kg	湛水散布	1 回※
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ アオミドロ・藻類による 表層はく離	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫90日前まで			

※インダノファンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ピラクロニルを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ベンゾピシクロンを含む農薬の総使用回数：3回以内

②ライジンパワー ジャンボ

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 多年生広葉雑草 アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植後3日～ ノビエ2.5葉期 但し、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10 個 (500g)	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	1 回※
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ アオミドロ・藻類による 表層はく離	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫90日前まで			

※インダノファンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ピラクロニルを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ベンゾピシクロンを含む農薬の総使用回数：3回以内

### ③ライジンパワーフロアブル

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稲	一年生雑草 多年生広葉雑草 エゾノサヤマカグサ	移植後3日～ ノビエ2.5葉期 但し、 移植後30日まで	500 ml	原液湛水散 布又は水口 施用	1 回※
直播水稲	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ アオミドロ・藻類による 表層はく離	湛水直播の稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫90日前まで		原液湛水散 布	

※インダノファンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ピラクロニルを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数：3回以内