

フェンヘキサミド水和剤 パスワード顆粒水和剤	取扱メーカー： バイエル、ホクサン 原体メーカー： バイエル
成分： フェンヘキサミド〔ヒドロキシアニリド系 PRTR・2種〕…50.0%	性状： 暗褐色水和性細粒 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】

- 新しい系統の薬剤で、ぶどう、かんきつなどの灰色かび病及びおうとう、ももなどの灰星病に有効で、既存の耐性菌に対しても高い効果を示す。
- 顆粒水和剤なので、粉立ちが少なく使いやすい薬剤である。
- 病原菌の胞子の発芽管伸長を強く抑制し、発病前の散布で高い予防効果を発揮し、長い残効性を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節する。

【薬効・薬害等の注意】

- 適用作物（おうとう、ぶどう）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】

- 粉末は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。



【適用と使用法】

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	フェンヘキサミドを 含む農業の総使用回数		
お う と う	幼果菌核病	1000 倍	200 ～ 700 ℓ	前日まで	2 回以内	散布	2 回以内		
す も も も も も	灰星病	1000 ～ 1500 倍		14 日前 まで				3 回以内	3 回以内
ぶ ど う	白腐病	1000 倍							
か ん き つ	灰色かび病	1000 ～ 1500 倍	100 ～ 300 ℓ	7 日前まで	3 回以内				
いんげんまめ あ ず き		1500 ～ 3000 倍	200 ～ 700 ℓ	21 日前 まで	2 回以内				
ホ ッ プ									