

エトフェンプロックス乳剤 トレボン乳剤	取扱メーカー： クミカ、サンケイ、三井アグロ、 ホクサン 原体メーカー： 三井アグロ
成分： エトフェンプロックス〔ピレスロイド系 PRTR・1種〕…20.0% その他 PRTR 該当成分： キシレン〔PRTR・1種〕……………40%〈27～50%〉 エチルベンゼン〔PRTR・1種〕……………38%〈27～50%〉	性状： 淡黄色澄明可乳化油状液体 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級Ⅲ

【品目特性】……………

- 水稲、野菜、果樹、茶など幅広い作物に使用できる。また、ウンカ類、カメムシ類、コブノメイガなどの水稲害虫や、野菜のコナジラミ類、アブラムシ類、ヨトウムシ、アオムシ、コナガなど広い範囲の害虫に殺虫効果を示す。
- 各種の花きに加えて「樹木類」に登録を持つことに加えて、人畜への毒性が低いため、街路樹や公園の害虫防除にも適している。
- かんきつの訪花害虫に対して、飛来防止や摂食阻害など、特異な忌避作用を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【薬効・薬害等の注意】……………

- かんきつ、茶での散布は、場合によりハダニ類がふえることがあるので注意する。
- ねぎのシロイチモジヨトウの防除に使用する場合は、食入前の若令幼虫期に散布する。
- きくのアブラムシ類への使用に当たっては、一部地域のワタアブラムシでは効果が劣ることがあるので使用をさける。
- 採種用とうきで使用する場合は、根部及び葉を収穫せず、種子の収穫に限る。
- 水耕栽培に使用する場合は、本剤を使用した施設からの廃液を灌漑水路、排水路、河川等には絶対に流さず、適切に処理する。
- 本田の水稲に希釈倍数300～600倍で散布する場合、所定量を均一に散布できる乗用型の速度運動式地上液剤少量散布装置を使用する。

【安全対策上の注意】……………

- 甲殻類、冷水魚に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。養殖池等周辺での使用はさける。比較的低濃度でも魚が平衡失調を起こすおそれがあるので、十分注意する。
- 自動車等の塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意する。
- 誤って飲み込んだ場合は吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせる。
- 本剤は眼に強い刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 原液は皮膚に刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 危険物第四類第二石油類に属するので、火気には十分注意する。
- 火気をさけて保管する。
- 共通注意事項6．街路・公園・堤とう等で使用する場合は注意事項を参照。
- 共通注意事項7．ミツバチに対する注意事項を参照。
- 共通注意事項8．適用作物群に対する注意事項を参照。



【適用と使用法】

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	イトフェンプロックスを 含む農薬の併使用回数					
稲	－	コブノメイガ	1000 倍	60 ～ 150 ℓ	14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内					
		ツマグロヨコバイ ウンカ類 イネドロオイムシ イナゴ類	1000 ～ 2000 倍										
		カメムシ類 イネミズゾウムシ	2000 倍										
		ウンカ類	300 ～ 600 倍	25 ℓ									
		ツマグロヨコバイ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	300 倍										
		カメムシ類	600 倍										
小 麦		ヒメトビウンカ アブラムシ類	2000 倍	60 ～ 150 ℓ	14 日前まで	2 回以内		2 回以内					
き び		アカスジカスミカメ	1000 倍	100 ～ 300 ℓ		3 回以内		3 回以内					
あ わ		アワヨトウ			7 日前まで	4 回以内		4 回以内					
とうもろこし		アワノメイガ アワヨトウ		200 ～ 700 ℓ					14 日前まで	3 回以内	3 回以内		
かん き つ		コアオハナムグリ ケシキスイ類	1000 ～ 2000 倍		7 日前まで	2 回以内		2 回以内					
		ミカンハモグリガ										1000 倍	3 日前まで
マンゴー		チャノキイロアザミウマ							1000 ～ 2000 倍				
ブロッコリー		アオムシ	14 日前まで		3 回以内	3 回以内							
キャベツ		アオムシ コナガ ヨトウムシ						3 日前まで				4 回以内	4 回以内
はくさい		アブラムシ類								3 回以内	3 回以内		
だいこん		シロイチモジヨトウ	3 回以内		3 回以内								
ねぎ		アブラムシ類				3 回以内		3 回以内					
レタス	アブラムシ類 コナジラミ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ	3 回以内					3 回以内						
す い か	アブラムシ類 コナジラミ類		1000 倍		100 ～ 300 ℓ					前日まで	3 回以内	3 回以内	
	きゅうり					アブラムシ類 コナジラミ類		3 回以内					3 回以内
メロン	アブラムシ類 コナジラミ類 ヨトウムシ類 カメムシ類 ウリノメイガ	1000 ～ 2000 倍				1000 倍	3 回以内						
に が う り	コナジラミ類 ウリハムシ		1000 倍		1000 倍					3 回以内	3 回以内		
	かぼちゃ							アブラムシ類				1000 倍	1000 倍
な す	コナジラミ類	1000 倍				1000 倍	3 回以内	3 回以内					
トマト	アブラムシ類		1000 倍		1000 倍					3 回以内	3 回以内		
ピーマン	アブラムシ類											1000 倍	1000 倍

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	イトフェンプロックスを 含む農薬の総使用回数			
オ ク ラ	—	アブラムシ類 カメムシ類	1000 倍	100～ 300 ℓ	前日まで	3 回以内	散布	3 回以内			
さやえんどう 実えんどう		シロイチモジヨトウ ヨトウムシ ウラナミシジミ							2 回以内	2 回以内	
さやいんげん		ワタアブラムシ ウラナミシジミ マメノメイガ				14日前まで					
え だ ま め		マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ウコンノメイガ ツメクサガ									
		ハスモンヨトウ	1000 ～ 2000 倍								
未成熟さざげ ばれいしょ		アブラムシ類			前日まで	3 回以内			3 回以内		
か ん し ょ		ナカジロシタバ アブラムシ類 ハスモンヨトウ			7 日前まで					14日前まで 7 日前まで	
		さ と い も			ハスモンヨトウ						
さといも (葉柄)		アブラムシ類 ヤマノイモコガ ハスモンヨトウ									
やまのいも やまのいも (むかご)		マメシンクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ アズキノメイガ	1000 倍		14日前まで	2 回以内			2 回以内		
豆 類 (種実、但し だいず、あずき を除く)		マメシンクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ アズキノメイガ ウコンノメイガ ツメクサガ									
だ い ず											

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロックスを 含む農薬の総使用回数							
あ　　ず　　き	－	マメシクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ ノメイガ類	1000 倍	100 ～ 300 ℓ	14 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内							
ほ　う　き　ぎ		ホウキギツツミノガ	1000 ～ 2000 倍		30 日前まで	3 回以内		3 回以内							
し　　ょう　　が 葉しょうが		ハスモンヨトウ			7 日前まで										
て　ん　さ　い		ヨトウムシ			1000 倍	14 日前まで		1 回	1 回						
せんきゆう		ウリハムシモドキ	1000 倍		3 回以内			3 回以内							
モロヘイヤ		アザミウマ類	2000 倍												
あ　し　た　ば		アブラムシ類 コナジラミ類 フキノメイガ ヨトウムシ	1000 倍			2 回以内			2 回以内						
ふ　　　　き		アブラムシ類			2000 倍			3 回以内		2 回以内					
う　　　　ど											1000 倍	2 回以内	2 回以内		
み　　つ　　ば														2 回以内	2 回以内
食　用　　ぎ　　く															
せ　　　　り	1000 倍		100 ～ 150 ℓ	30 日前まで		3 回以内									
せ　　　　り (水耕栽培)		3 回以内			3 回以内										
み　　ず　　い　　も								オキナワイナゴモドキ	14 日前まで	3 回以内	3 回以内				
茶							－	チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ	2000 倍	200 ～ 400 ℓ	摘採21 日 前 まで	2 回以内	2 回以内		
た　　ば　　こ								タバコガ ヨトウムシ	1000 ～ 2000 倍	25 ～ 180 ℓ	—				
	アブラムシ類		100 ～ 300 ℓ	幼虫 発生期		6 回以内		6 回以内							
採種用とうき	キアゲハ	4000 倍	100 ～ 700 ℓ		幼虫 発生期										
樹　　木　　類 (つつじ類, ポインセチア, ソテツを除く)	ケムシ類 シャクトリムシ類	2000 倍							幼虫 発生期						
	オビカレハ	4000 倍													
つつ　じ　　類	ツツジグンバイ	2000 倍		幼虫 発生期											
	ケムシ類 シャクトリムシ類	4000 倍													
	オビカレハ	2000 倍													

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	イトフェンプロックスを 含む農薬の総使用回数
ポインセチア	—	コナジラミ類	1000 倍	100 ～ 700 ℓ	—	6 回以内	散布	6 回以内
		ケムシ類 シャクトリムシ類	4000 倍		幼虫 発生期			
		オビカレハ	2000 倍					
クロマダラソテツシジミ		2000 ～ 4000 倍						
ソ テ ツ		ケムシ類 シャクトリムシ類	4000 倍	100 ～ 300 ℓ	—	発生初期		
		オビカレハ	2000 倍					
		シロイチモジヨトウ	1000 倍					
宿根かすみそう		ヨトウムシ	2000 倍					
りんどう		ヒラズハナアザミウマ						
き く カーネーション		アブラムシ類						
ゆ り		ハスモンヨトウ	1000 倍					
トルコギキョウ								
水田作物、 畑作物 (休耕田)	ヨシ、オギ、 ススキ、セイ タカアワダ チソウ等の 多年生雑 草が優占し ている休耕田	カメムシ類	2000 倍	60 ～ 150 ℓ	—	3 回以内		3 回以内